

Flóra Húnavatnssýslu

Þær upplýsingar sem hér eru teknar saman eru unnar að mestu upp úr gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Æskilegt væri að notendur þessarar flóru, sem telja sig vita um fleiri villtar plöntur í sýslunni, eða vita um fleiri fundarstaði fágætra plantna sem hér eru nefndar, mundu hafa samband og senda skeyti þar um á hkris@nett.is svo hægt sé að bæta við þær upplýsingar sem hér eru. Verður þeim upplýsingum þá jafnframt komið áfram í gagnagrunn Náttúrufræðistofnunar á nafni þess heimildarmanns sem finnur og greinir plöntuna. Þessum gagnagrunni er ætlað að varðveita sem fyllstar upplýsingar um flóru alls landsins.

Frumkvæði að þessari samantekt kemur frá erindi um Flóru Húnavatnssýslu sem tekið var saman fyrir málþingið Húnvetnsk náttúra 2010 sem haldið var að Gauksmýri, 10. Apríl 2010. Útdráttur úr þessu erindi birtist í skýrslu á vegum Náttúrustofu Norðurlands vestra á Sauðárkróki og Selaseturs Íslands á Hvammstanga, og má skoða hann hér.

Það er von mín, að þessi úttekt á Flóru Húnavatnssýslu verði hvatning til allra Húnvetninga að líta í kring um sig og koma upplýsingum um flóru síns nágrennis á framfæri, því engir hafa betri möguleika á að afla þekkingar á umhverfi sínu, en þeir sem búa á svæðinu.

Hörður Kristinsson

Jafnaætt

Skollafingur - *Huperzia selago* – Algengur.

Lyngjafni - *Lycopodium annotinum* – Mjög sjaldgæfur. Selfell á Skagaheiði (H.Kr.).

Litunarjafni - *Diphasiastrum alpinum* – Algengur utan til á Skaga og í Laxárdal. Utan þess svæðis aðeins skráður við Gafl í Víðidal (H.Kr.) og við Hveravelli á Kili.

Mosajafnaætt

Mosajafni - *Selaginella selaginoides* – Mjög algengur.

Álftalauksætt

Álftalaukur - *Isoetes echinospora* – Í Svínavatni (Std.). Ófundinn annars staðar.

Elftingarætt

Klóelfting - *Equisetum arvense* – Mjög algeng.

Fergin - *Equisetum fluviatile* – Víða í votlendi um allt svæðið.

Eski - *Equisetum hyemale* – Allvíða um héraðið.

Mýrelfting - *Equisetum palustre* – Algeng.

Vallelfting - *Equisetum pratense* – Algeng.

Beitieski - *Equisetum variegatum* – Algengt.

Naðurtunguætt

Naðurtunga - *Ophioglossum azoricum* – Aðeins við jarðhita á Hveravöllum.

Lensutungljurt - *Botrychium lanceolatum* – Aðeins á tveim stöðum, Kirkjuhvammi á Vatnsnesi (Std.) og við Arnarvatn (H.J.).

Tungljurt - *Botrychium lunaria* – Algeng um alla sýsluna.

Dvergtungljurt - *Botrychium simplex* – Mjög sjaldgæf, Hveravellir á Kili.

Liðfætlætt

Púsundblaðarós - *Athyrium distentifolium* – Mjög sjaldgæf, aðeins fundin á Steinnýjarstöðum á Skaga.

Liðfætla - *Woodsia ilvensis* – Sjaldgæf. Kárastaðir á Vatnsnesi (Std.), Jörundarfell (H.Hg.).

Tófugras - *Cystopteris fragilis* – Algengt.

Prílaufungur - *Gymnocarpium dryopteris* – Á nokkrum stöðum á Skaga frá Hallárdal og utar. Einnig í hólum í Eyjavatni (H.Kr.) og Friðmundarvatni vestara (H.Þorg.) á Auðkúluheiði. Ófundinn annars staðar.

Skjaldburknaett

Dílaburkni - *Dryopteris expansa* – Mjög sjaldgæfur. Fannhólahryggur í Norðurárdal (Sv. Alb.).

Skjaldburkni - *Polystichum lonchitis* – Sjaldgæfur, aðeins á Skaga. Geldingaskarð (H.Kr.) og Steinnýjarstaðir (Std.) á Skagaströnd, Mánaskál í Laxárdal, fjallið (H.Kr.), Litla-Vatnsskarð (H.Kr.).

Príhrynburknaett

Príhrynburkni - *Phegopteris connectilis* – Sjaldgæfur. Barð (H.Kr.) og Austurárgil (Ant.H.) í Miðfirði, Gafli í Víðidal (H.Kr.).

Köldugrasætt

Köldugras - *Polypodium vulgare* – Sjaldgæft. Bjarghús í Vesturhópi (Hólmg.Bj.), Auðunnarstaðir í Víðidal (Auð.Jóh.). Skagaströnd við kaupstaðinn (H.Hg.).

Einisætt

Einir - *Juniperus communis* – Á nokkrum stöðum frá Laxá á Ásum um Blönduós og norður á Skaga. Einnig víða á Auðkúluheiði og Eyvindarstaðaheiði. Ekki kunnugt um hann annars staðar..

Víðisætt

Alaskavíðir - *Salix alaxensis* – Sjálfsáður a.m.k. á einum stað, Blöndudalur neðan virkjunar (H.Kr.).

Fjallavíðir - *Salix arctica* – Mjög algengur.

Grasvíðir - *Salix herbacea* – Mjög algengur.

Loðvíðir - *Salix lanata* – Algengur.

Víðja - *Salix myrsinifolia* – Sjálfsáður a.m.k. á einum stað, sunnan við Gilsárgil í Blöndudal (H.Kr.).

Gulvíðir - *Salix phylicifolia* – Algengur.

Bjarkarætt

Fjalldrapi - *Betula nana* – Algengur.

Birki - *Betula pubescens* – Víða í Vatnsdal og dölunum þar fyrir austan, Blöndugil. Einnig allvíða úti á Skaga. Aðeins við Borgarvirki í Vestur-sýslunni.

Súruætt

Túnsúra - *Rumex acetosa* – Mjög algeng.

Hundasúra - *Rumex acetosella* – Algeng á láglandi.

Njóli - *Rumex longifolius* – Algengur í byggð.

Ólafssúra - *Oxyria digyna* – Algeng.

Kornsúra - *Bistorta vivipara* – Mjög algeng. um alla sýsluna og öræfin.

Naflagras - *Koenigia islandica* – Algengt.

Blóðarfi - *Polygonum aviculare* – Algengur í byggð.

Gullintoppuætt

Geldingahnappur - *Armeria maritima* – Mjög algengur.

Hélunjólaætt

Hrímblaðka - *Atriplex glabriuscula* – Víða í fjörum við Hrutafjörð og á Vatnsnesi. Trúlega víðar í fjörum þótt heimildir skorti.

Grýtuætt

Lækjagrýta - *Montia fontana* – Algeng.

Hjartagrasætt

Fjallkrækill - *Sagina caespitosa* – Sjaldgæfur, aðeins inn á heiðum. Við Þórarinsvatn (H.Kr.) og Birnuhöfða (Guðr.Á.J.) á Grímstunguheiði. Austurbrún Helgufells á Auðkúluheiði (H.Kr.).

Snækrækill - *Sagina nivalis* – Algengur til fjalla og inni á heiðum.

Hnúskakrækill - *Sagina nodosa* – Algengur.

Skammkrækill - *Sagina procumbens* – Algengur.

Langkrækill - *Sagina saginoides* – Algengur.

Fjallanóra - *Minuartia biflora* – Algeng til fjalla og inn á heiðunum.

Melanóra - *Minuartia rubella* – Algeng.

Móanóra - *Minuartia stricta* – Víða á öllum heiðunum frá Austurárdalsheiði til Eyvindarstaðaheiðar. Miklu strjálmi niðri í byggð, ófundin á Vatnsnesi og úti á Skaga.

Fjöruarfi - *Honckenya peploides* – Algengur meðfram ströndinni.

Skeggsandi - *Arenaria norvegica* – Algengur.

Línarfi - *Stellaria borealis* – Mjög sjaldgæfur. Efri-Núpur í Miðfirði (Std.), Eyjavatn á Auðkúluheiði (H.Kr.), Friðmundarvatn vestara (H.Hg.).

Stjörnuarfi - *Stellaria crassifolia* – Algengur.

Lágarfi - *Stellaria humifusa* – Aðeins á sjávarfitjum. Oddsstaðir (H.Kr.) og Fjarðarhorn (Guðr.J.) í Hrutafirði. Kerlingarbjarg (Th.Höv.) og Kálffhamarsvík (H.Kr.) á Skagaströnd.

Haugarfi - *Stellaria media* – Algengur.

Músareyra - *Cerastium alpinum* – Mjög algengt.

Lækjafræhyrna - *Cerastium cerastoides* – Algeng.

Vegarfi - *Cerastium fontanum* – Algengur.

Fjallafræhyrna - *Cerastium nigrescens* – Algeng í fjöllum ofan 6-700 m hæðar, stundum neðar. Langihryggur og Þrælsfell á Vatnsnesi (H.Kr. & Eyb.Ein.), Tungukollur á Aðalbólshéiði og Krákshraun (H.Kr.). Víða á Vatnsdalsfjalli og í Skagastrandarfjöllum.

Ljósberi - *Viscaria alpina* – Algengur.

Lambagras - *Silene acaulis* – Mjög algengt.

Akurarfi - *Stellaria graminea* – Allútbreiddur slæðingur. Hvammstangi (I. Dav.), Hnausar í Vatnsdal (G.Gígja), Blönduós (I. Dav.), Hrafndalur á Skaga (H.Kr.),

Dagstjarna - *Silene dioica* – Slæðingur á Blönduósi, Skagaströnd og Kálffhamarsvík (H.Kr.).

Holurt - *Silene uniflora* – Allalgeng.

Sóleyjaætt

Hófsóley - *Caltha palustris* – Algeng um byggðina og nokkuð inn á heiðar.

Brjóstagras - *Thalictrum alpinum* – Mjög algengt.

Jöklasóley – *Ranunculus glacialis* – Víða á hærri fjöllum, bæði á Vatnsnesi, Víðidals-, Vatnsdals og Svínadalsfjöllum, svo og á Skagastrandarfjöllum.

Brennisóley - *Ranunculus acris* – Mjög algeng.

- Sifjarsóley** - *Ranunculus auricomus* – Mjög sjaldgæf. Í 550 m hæð í skriðum í Spákonufellsborg.
- Trefjasóley** - *Ranunculus hyperboreus* – Algeng.
- Dvergsóley** - *Ranunculus pygmaeus* – Víða til fjalla.
- Skriðsóley** - *Ranunculus repens* – Á nokkrum stöðum við bæi. Fjarðarhorn í Hrótafirði (Guðr.J.), Bjarghús í Vesturhópi (Hólmg.Bj.), Blönduós (I.Dav.).
- Lónasóley** - *Ranunculus confervoides* – Víða um svæðið í tjörnum og pollum.

Draumsóleyjaætt

- Melasól** - *Papaver radicum* – Víða á vestanverðu Vatnsnesi (Std.), Gröf í Víðidal (St.St.), Reykjanibba á Svínadalsfjalli (St.Heiðm.), Miðgil í Langadal (J.Eyp.) og allvíða á Skagaströnd.

Krossblómaætt

- Melablóm** - *Arabidopsis petraea* – Mjög algengt.
- Aronsvöndur** - *Erysimum strictum* – Sjaldgæfur. Marðarnúpsgil í Vatnsdal (G.Gígja), Máfabjarg við Höllustaði í Blöndudal (Æv.Pet.), Ártún í Blöndudal (E. Þorl.).
- Kattarjurt** - *Rorippa islandica* – Sjaldgæf. Langavatn í Refasveit (H.Kr.), Kollugerðisvatn á Skagaströnd (H.Kr.).
- Jöklaklukka** - *Cardamine bellidifolia* – Langihryggur og Þrælsfell á Vatnsnesi (H.Kr.), Vatnsdalsfjall (Eyp.Ein.), Tjarnardalir og Oddnýjarhnjúkur á Kili (Eyp.Ein.).
- Lambaklukka** - *Cardamine hirsuta* – Sjaldgæfur slæðingur. Hvammstangi (I.Dav.), Hveravellir á Kili (Æv.Pet.).
- Hrafnaklukka** - *Cardamine pratensis* – Algeng.
- Skriðnablóm** - *Arabis alpina* – Algengt.
- Grávorbblóm** - *Draba incana* – Algeng.
- Héluvorbblóm** - *Draba nivalis* – Á nokkrum stöðum í austanverðri sýslunni. Núpur og Mjóidalur í Laxárdal (H.Kr.). Norðurendi Sauðafells á Auðkúluheiði (H.Kr.). Við Stafnsfell austan Svartárdals (H.Kr.), Galtarárdrog á Eyvindarstaðaheiði (H.Kr.), Hveravellir (St.St.).
- Hagavorbblóm** - *Draba norvegica* – Algengt.
- Fjallavorbblóm** - *Draba oxycarpa* – Mjög sjaldgæft. Hundadalafjöll og Oddnýjarhnjúkur á Kili (Eyp. Ein.).
- Vorperla** - *Draba verna* – Allalgeng í austanverðri sýslunni. Aðeins fundin umhverfis Bakka í Víðidal í Vestursýslunni.
- Skarfakál** - *Cochlearia officinalis* – Algengt meðfram sjónum í klettum.
- Hjartarfi** - *Capsella bursa-pastoris* – Algengur.
- Alurt** - *Subularia aquatica* – Algeng í vötnum í Refasveit og á Skagaströnd. Öxna á Víðidalstunguheiði (Std.), Kolkufló á Auðkúluheiði (H.Kr.), Svínavatn (H.Kr.).

Helluhnoðraætt

- Burnirót** - *Rhodiola rosea* – Algeng.
- Helluhnoðri** - *Sedum acre* – Algengur.
- Flagahnoðri** - *Sedum villosum* – Mjög algengur.

Mýrasóleyjaætt

- Mýrasóley** - *Parnassia palustris* – Algeng.

Steinbrjótsætt

- Þúfusteinbrjótur** - *Saxifraga cespitosa* – Algengur.
- Laukasteinbrjótur** - *Saxifraga cernua* – Algengur til fjalla.
- Gullbrá** - *Saxifraga hirculus* – Algeng.
- Mosasteinbrjótur** - *Saxifraga hypnoides* – Algengur.

Snæsteinbrjótur - *Saxifraga nivalis* – Algengur.

Vetrarblóm - *Saxifraga oppositifolia* – Algengt.

Bergsteinbrjótur - *Saxifraga paniculata* – Sjaldgæfur. Hvarfsgljúfur í Víðidal (Bergþ. Sig.), Hjallaklettur (St.St.), Jörundarfell (H.Hg.), Skinnhúfuklettur (G.Gígja) og Hvammur (Eyp.Ein.) í Vatnsdal. Ekki fundinn annars staðar.

Lækjasteinbrjótur - *Saxifraga rivularis* – Algengur.

Toppasteinbrjótur - *Saxifraga rosacea* – Algengur.

Stjörnusteinbrjótur - *Saxifraga stellaris* – Algengur.

Dvergsteinbrjótur - *Saxifraga tenuis* – Víða til fjalla.

Rósaætt

Fjalldalafífill - *Geum rivale* – Algengur.

Holtasóley - *Dryas octopetala* – Algeng.

Fjallasmári - *Sibbaldia procumbens* – Alls staðar algengur til fjalla, en á láglendi aðeins í útsveitum.

Gullmura - *Potentilla crantzii* – Algeng.

Tágamura - *Argentina anserina* – Víða í lágsveitum og með ströndinni.

Engjarós - *Comarum palustre* – Algeng.

Jarðarber - *Fragaria vesca* – Á nokkrum stöðum í Austur-sýslunni frá Skagaströnd innanverðri um Langadal og inn í Vatnsdal. Ekki skráð annars staðar.

Hrútaber - *Rubus saxatilis* – Algeng.

Ljónslappi - *Alchemilla alpina* – Algengur.

Mariustakkur - *Alchemilla filicaulis* – Algengur.

Hnoðamariustakkur - *Alchemilla glomerulans* – Algengur.

Silfurmariustakkur - *Alchemilla wichurae* - Allvíða.

Reynir - *Sorbus aucuparia* – Sjaldgæfur, Hvammsurð í Vatnsdal (St.St.).

Belgjurtaætt

Alaskalúpína - *Lupinus nootkatensis* – Á víð og dreif um stóran hluta byggðarinnar.

Alsikumári - *Trifolium hybridum* – Slæðingur sem einkum finnst í sáningum meðfram þjóðvegum. Skinnastaðir – Húnsstaðir á Ásum (H.Kr.), eflaust mun víðar.

Rauðsmári - *Trifolium pratense* – Slæðingur í vegsáningum. Austan við Hvammstangavegamót (H.Kr.), Skinnastaðir – Húnsstaðir á Ásum (H.Kr.).

Hvítsmári - *Trifolium repens* – Algengur á láglendi. Galtará á Eyvindarstaðaheiði (H.Kr.), Hveravellir (Sig.H.Magn.).

Umfeðmingur - *Vicia cracca* – Hindisvík á Vatnsnesi (Std.). Allvíða miðsvæðis í Austur-sýslunni. Hrútey við Blönduós (H.Kr.), Hofsmelar í Vatnsdal (Ág.B.J.).

Baunagras - *Lathyrus japonicus* – Melstaður í Miðfirði (A. Fedd. 1884)

Blágresisætt

Blágresi - *Geranium sylvaticum* – Algengt.

Fjóluætt

Týsfjóla - *Viola canina* – Algeng.

Mýrfjóla - *Viola palustris* – Algeng.

Þrenningarfjóla - *Viola tricolor* – Kárastaðir á Vatnsnesi (Std.). Víða í Vesturhópi og Vatnsdal og þar fyrir austan.

Eyrarrósarætt

Lindadúnurt - *Epilobium alsinifolium* – Algeng.

Fjalladúnurt - *Epilobium anagallidifolium* – Algeng til fjalla.
Klappadúnurt - *Epilobium collinum* – Á nokkrum stöðum í Vatnsdal, ófundin annars staðar.
Heiðadúnurt - *Epilobium hornemannii* – Algeng.
Ljósadúnurt - *Epilobium lactiflorum* – Víða.
Mýradúnurt - *Epilobium palustre* – Algeng.
Sigurskúfur - *Chamerion angustifolium* – Vatnsdalur á nokkrum stöðum. Mánaskál í Laxárdal (H.Kr.).
Eyrarrós - *Chamerion latifolium* – Víða um allt héraðið bæði á áreyrum, árgljúfrum og giljum og einnig inni á hálendinu.

Maraætt

Síkjamarí - *Myriophyllum alterniflorum* – Algengur í vötnum og tjörnum.

Skollabersætt

Skollaber - *Cornus suecica* – Mjög sjaldgæf. Austurnúpur á Skaga (Th.Höv.), Selfell á Skagaheiði (H.Kr.).

Sveipjurtaætt

Skógarkerfill - *Anthriscus sylvestris* – Víða um héraðið.
Spánarkerfill - *Myrrhis odorata* – Slæðingur sem dreifist nokkuð, einkum meðfram lækjum. Laugarbakki í Miðfirði (H.Kr.), Hvammstangi (I. Dav.), Syðri-Hóll, Njálstaðir og Skagaströnd (H.Kr.).
Kúmen - *Carum carvi* – Slæðingur á Höskuldsstöðum á Skagaströnd (H.Kr.).
Sæhvönn - *Ligusticum scoticum* – Sjaldgæf, í sjávarklettum. Bjarg í Miðfirði (St.St.), Laxárgil Skagaströnd, neðst við sjóinn (Sv.Alb.).
Ætihvönn - *Angelica archangelica* – Víða, einkum með sjó og inni á hálendinu.
Geithvönn - *Angelica sylvestris* – Vesturhóp, víða í Vatnsdal og umhverfis Blönduós.

Vetrarliljuætt

Klukkublóm - *Pyrola minor* – Algengt.
Grænlilja - *Orthilia secunda* – Aðeins fundin rétt austan sýslumarka í suðurhlíðum Sandfells á Skaga (H.Kr.), ófundin í Húnavatnssýslu.

Lyngætt

Sauðamergur - *Loiseleuria procumbens* – Algengur.
Mosalýng - *Harrimanella hypnoides* – Algengt, einkum upp til fjalla og inni á heiðum.
Sortulyng - *Arctostaphylos uva-ursi* – Allvíða á nokkru svæði frá Giljá um Ása og Svínadal út í Refasveit. Einnig umhverfis Blöndugil.
Beitilyng - *Calluna vulgaris* – Á nokkrum stöðum innst á Skaga, við Blönduós og á Ásum. Ófundin annars staðar.
Aðalbláberjalyng - *Vaccinium myrtillus* – Algengt, mest í útsveitum.
Bláberjalyng - *Vaccinium uliginosum* – Mjög algengt.

Krækilyngsætt

Krækilyng - *Empetrum nigrum* – Mjög algengt.

Fjallabrúðuætt

Fjallabrúða - *Diapensia lapponica* – Aðeins fundin á Skaga. Fjallsöxl (Std. & H.Kr.), Svínahnjúkur (Sv.Alb.), Langadalsfjöll við Holtastaði (St.St.).

Mariúvandarætt

Dýragras - *Gentiana nivalis* – Algengt.

Engjavöndur - *Gentianopsis detonsa* – Víða í Austur-sýslunni, einkum í Vatnsdal. Þingeyrar (H.Kr.), Kerlingarbjarg á Skaga (Th.Höv.), Æsustaðir í Langadal (Sig. P.).

Mariúvendlingur - *Comastoma tenellum* – Víða í innsveitum og uppi á heiðunum.

Grænvöndur - *Gentianella amarella* – Víða á láglendi.

Gullvöndur - *Gentianella aurea* – Algengur á láglendi.

Mariúvöndur - *Gentianella campestris* – Algengur á láglendi.

Blástjarna - *Lomatogonium rotatum* – Barð í Miðfirði (H.Kr.). Víða í innsveitum í austanverðri sýslunni, bæði í Vatnsdal, á Þingeyrum, við Svínavatn, í Blöndudal og Svartárdal. Einnig inni á heiðunum, t.d. við Ströngukvísl.

Horblöðkuætt

Horblaðka - *Menyanthes trifoliata* – Algeng.

Möðruætt

Krossmaðra - *Galium boreale* – Allvíða í Vestur-sýslunni, Hrutafirði, Miðfirði, Vatnsnesi, Vesturhópi og Víðidal. Aðeins fundin á tveim stöðum í Austur-sýslunni, Spákonufellshöfði (M.B.Arn.) og Hrutey við Blönduós (Unnur Kr.)

Hvítmaðra - *Galium normanii* – Algeng.

Þrenningarmaðra - *Galium trifidum* – Mjög sjaldgæf, aðeins á einum stað í Litluborgarkötlum í Vesturhópi (St.St.).

Gulmaðra - *Galium verum* – Algeng.

Vatnsbrúðuætt

Síkjabrúða - *Callitriche hamulata* – Allvíða, einkum austanvert við Húnaflóa.

Vorbrúða - *Callitriche palustris* – Á víð og dreif.

Lófótsætt

Lófótur - *Hippuris vulgaris* – Algengur.

Munablómsætt

Gleym-mér-ei - *Myosotis arvensis* – Algeng í byggð.

Engjamunablóm - *Myosotis scorpioides* – Slæðingur sem er ílendur víða í byggð, einkum meðfram ám og lækjum.

Sandmunablóm - *Myosotis stricta* – Þingeyrar (H.Kr.), Giljá (Kr.Guðbr.), víða í Vatnsdal, Svínadal og Svartárdal.

Blálilja - *Mertensia maritima* – Algeng í fjörum.

Klóajurt - *Asperugo procumbens* – Mj. sjaldgæf, Þingeyrar (H.Stef.). Talin hafa vaxið þar síðan á tíma klaustursins á miðöldum, var þarna enn árið 2009.

Varablómaætt

Ljósatvítönn – *Lamium album* – Hvammstangi (I.Dav.), Brekka í Vatnsdal (I.Dav.). Tindar á Ásum, Grund í Svínadal, Blönduós, Skrapatunga á Skagaströnd (I.Dav.). Á flestum bæjum í Langadal, Blöndudal og Svartárdal.

Blóðberg - *Thymus praecox* – Algengt.

Grímublómaætt

- Efjugras** - *Limosella aquatica* – Mjög sjaldgæft. Stóra Giljá (H.Kr.).
Fjalladepla - *Veronica alpina* – Algeng.
Steindepla - *Veronica fruticans* – Algeng.
Hárdepla - *Veronica officinalis* – Sjaldgæf. Vindhæli á Skagaströnd (Std.), Æsustaðir í Langadal (Sig.P.).
Skriðdepla - *Veronica scutellata* – Allvíða á láglendi.
Lækjadepla - *Veronica serpyllifolia* – Algeng.
Augnfró - *Euphrasia frigida* – Algeng.
Lokasjóður - *Rhinanthus minor* – Algengur.
Tröllastakkur - *Pedicularis flammea* – Algengur til fjalla.
Smjörgras - *Bartsia alpina* - Algengt.

Blöðrujurtarætt

- Lyfjagras** - *Pinguicula vulgaris* – Algengt.

Græðisúruætt

- Græðisúra** - *Plantago major* – Slæðingur á nokkrum stöðum. Blönduós (I.Dav.), Húnavellir (F.Guðm.), Vatnsdalur (Kr.Guðbr.).
Kattartunga - *Plantago maritima* – Algeng í láglendi.
Tjarnalaukur - *Littorella uniflora* – Við Arnarvatn á einum stað (H.Kr.).

Bláklukkuætt

- Bláklukka** - *Campanula rotundifolia* – Sjaldgæf. Skarð á Vatnsnesi (G.Gígja), Húnsstaðir (Jón Eyp.) og Árholt á Ástum (Vilhj.Gr.).
Fjallabláklukka - *Campanula uniflora* – Vatnsdalsfjall á nokkrum stöðum.

Körflómaætt

- Jakobsfífill** - *Erigeron borealis* – Algengur.
Snækobbi - *Erigeron humilis* – Mjög sjaldgæfur. Hundadalafjöll (F. Guðm.) og Oddnýjarhnjúkur við Langjökul (Eyp.Ein.).
Fjallakobbi - *Erigeron uniflorus* – Víða ofan til á heiðunum og á fjöllum við Vatnsdal og úti á Skaga.
Fjandafæla - *Omalotheca norvegica* – Allvíða á Vatnsnesi og úti á Skaga, annars sjaldgæf. Fundin á örfáum stöðum á heiðunum.
Grámulla - *Omalotheca supina* – Algeng út til annesja og upp til heiða, vantar á láglendinu miðsvæðis.
Grájurt - *Omalotheca sylvatica* – Á nokkrum stöðum í Hrótafirði, Vatnsnesi, Vesturhópi og á Skagaströnd.
Vallhumall - *Achillea millefolium* – Víða um byggðina.
Silfurhnappur - *Achillea ptarmica* – Auðólfstaðaskarð (A.Kaaber)
Baldursbrá - *Tripleurospermum maritimum* – Allvíða við bæi og í fjörum.
Hlaðkolla - *Lepidotheca suaveolens* – Algeng um alla byggðina.
Krossfífill - *Senecio vulgaris* – Slæðingur við Reykjaskóla í Hrótafirði (Óli E. Bj.), og á Blönduósi (I. Dav.).
Þistill - *Cirsium arvense* – Hvammstangi, Stóridalur, Sléttárdalur (I. Dav.).
Skarífífill - *Leontodon autumnalis* – Algengur.
Túnfíflar - *Taraxacum* – Mjög algengir.
Íslandsfífill - *Pilosella islandica* – Algengur á láglendi.
Fellafífill - *Hieracium alpinum* - Algengur
Arinfífill - *Hieracium aquiliforme* – Algengur.
Runnafífill - *Hieracium holopleurum* – Geitaskarð í Langadal (Std.) og á nokkrum stöðum þar í grennd.
Vargsfífill - *Hieracium lygistodon* – Sjaldgæfur.

Holtáfill - *Hieracium microdon* – Víða á láglendi.
Kögurfífill - *Hieracium phrioclonum* – Vakursstaðir í Hallárdal (Std.).
Vinafífill - *Hieracium stroemfeltii* – Ormsdalur í Vesturhópi (Std.), Blöndugil (H.Kr.).
Hlíðafífill - *Hieracium thaectolepium* – Víða á láglendi.

Sauðlauksætt

Mýrasauðlaukur - *Triglochin palustris* – Algengur.

Nykruætt

Fjallnykra - *Potamogeton alpinus* – Allvíða í vötnum.
Grasnykra - *Potamogeton gramineus* – Algeng á láglendi.
Hjartanykra - *Potamogeton perfoliatus* – Á nokkrum stöðum í vötnum á láglendi.
Langnykra - *Potamogeton praelongus* – Allvíða, einkum í stærri vötnum. Faxalækur í Vesturhópi (Hólmg.Bj.), Stóra Giljá (H.Kr.) og Flóðið í Vatnsdal (Sig.B.Jóh.), Laxárvatn (Std.), Svínavatn (H.Kr.), vötnin í Refasveit (H.Kr.), Hafnir á Skaga (Std.). Vatnshlíðarvatn (Sig.B.Jóh.), Blönduvatn (H.Kr.).
Práðnykra - *Stuckenia filiformis* – Algengur.

Marhálmsætt

Marhálmur - *Zostera angustifolia* – Hrutafjarðarbotn. (Gr.)

Brúsakollsætt

Mógrafabrúsi - *Sparganium hyperboreum* – Algengur.
Tjarnabrúsi - *Sparganium natans* – Allvíða.

Sýkigrasætt

Sýkigras - *Tofieldia pusilla* – Algengt.

Brönugrasætt

Brönugrös - *Dactylorhiza maculata* – Fremur óvíða. Hvammstangi, Kárastaðir og Ánastaðir á Vatnsnesi (Std.). Hafursstaðir á Skagaströnd (Hfr.Sig.), Neðstibær í Norðurárdal (Sv.Alb.), Laxárdalur (Eyp.-Ein.).
Barnarót - *Coeloglossum viride* – Algengur.
Friggjargras - *Platanthera hyperborea* – Algengt.
Hjónagras - *Pseudorchis straminea* – Algengt.
Hjartatvíblaðka - *Listera cordata* – Hlíð á Vatnsnesi (Std.). Fjall, Hrafnadalur og Brunnárgil á Skagaströnd (H.Kr.). Þverá í Hallárdal, Mánaskál og Illugastaðir í Laxárdal (H.Kr.).
Kræklurót - *Corallorhiza trifida* – Algeng frá Blönduósi út eftir öllum Skaga. Ófundin annars staðar.

Sefætt

Mýrasef - *Juncus alpinoarticulatus* – Algengt.
Hrossanál - *Juncus arcticus* – Algengur.
Laugasef - *Juncus articulatus* – Víða á láglendi.
Flagasef - *Juncus biglumis* – Algengt.
Lækjasef - *Juncus bufonius* – Víða á láglendi.
Hnúðsef - *Juncus bulbosus* – Sjaldgæft. Steinnýjarstaðir á Skagaströnd (Std.), Hólmavatn og Réttavatn í Refasveit (H.Kr.).
Dökkasef - *Juncus castaneus* – Á nokkrum stöðum á Skagaströnd, en hvergi annars staðar. Steinnýjarstaðir (Std.), Þúfnavelli í Hrafnadal (H.Kr.), Þverárfjall (H.Kr.).

Bráðsef - *Juncus filiformis* – Algengt á láglandi.
Lindasef - *Juncus ranarius* – Hvammur í Vatnsdal (H.Kr.), Hveravellir (F.Guðm., Sig. Magn.)
Móasef - *Juncus trifidus* – Mjög Algengt.
Boghæra - *Luzula arcuata* – Hvarvetna algeng til fjalla ofan 500-600
Fjallhæra - *Luzula confusa* – Á nokkrum stöðum til fjalla.
Vallhæra - *Luzula multiflora* – Algeng.
Axhæra - *Luzula spicata* – Mjög algeng.
Dökkhæra - *Luzula sudetica* – Allvíða, einkum austan til og inni á heiðunum.

Stararætt

Klófifa - *Eriophorum angustifolium* – Algeng.
Hrafnafifa - *Eriophorum scheuchzeri* – Algeng.
Mýrafinnungur - *Trichophorum cespitosum* – Algengur á láglandi, einkum í útsveitum.
Efjuskúfur - *Eleocharis acicularis* – Víða á láglandi um miðsvæði sýslunnar frá Miðfirði að Blönduósi.
Vatnsnál - *Eleocharis palustris* – Víða á láglandinu inn af Húnaflóa, einnig fundin í Miðfirði og á Vatnsnesi.
Fitjaskúfur - *Eleocharis quinqueflora* – Víða á láglandi.
Vætuskúfur - *Elocharis uniglumis* – Aðeins fundin á einum stað, á Hveravöllum við jarðhita.
Pursaskegg - *Kobresia myosuroides* – Mjög algengt.
Sótstör - *Carex atrata* – Algeng.
Hvítstör - *Carex bicolor* – Krákskraun (H.Kr.), Langifló og Blönduvaðsflói á Eyvindarstaðaheiði (H.Kr.), Hveravellir (H.Kr.).
Stinnastör - *Carex bigelowii* – Mjög algeng.
Blátoppastör - *Carex canescens* – Algeng.
Hárleggjastör - *Carex capillaris* – Algeng.
Hnappstör - *Carex capitata* – Algeng.
Vetrarkvíðastör - *Carex chordorrhiza* – Algeng.
Sérbýlisstör - *Carex dioica* – Algeng.
Ígulstör - *Carex echinata* – Sjaldgæf, aðeins austan Húnaflóa. Höskuldsstaðir (Std.), Sellækjargil í Norðurárdal (H.Kr.), við Illviðrishjúk í Laxárdal (Eyb. Ein.).
Dvergstör - *Carex glacialis* – Finnmörk í Fitjárdal og Gafl í Víðidal (H.Kr.). Víða á heiðunum þar fyrir innan og austan, Auðkúluheiði, Eyvindarstaðaheiði og í innanverðum dölunum, Svínadal, Blöndudal og Svartárdal.
Heigulstör - *Carex glareosa* – Á nokkrum stöðum með ströndinni í Hrutafirði, Miðfirði og við Húnaflóa.
Toppastör - *Carex krausei* – Á nokkrum stöðum á heiðunum. Guðlaugstungur, suðvestur af Tófumelum (Sig. Magn.). Langifló við botninn (H.Hg.). Blönduvaðsflói (H.Kr.).
Rjúpustör - *Carex lachenalii* – Hvarvetna algeng til fjalla.
Flóastör - *Carex limosa* – Víða í blautum flóum úti á Vatnsnesi (Std.). Helgavatnsflói í Vatnsdal (St.St.). Skagaströnd (Std.).
Fölvastör - *Carex livida* – Aðeins fundin á einum stað, í rennandi blautum flóa uppi á hálsinum milli Vatnsdals og Gljúfurár.
Gulstör - *Carex lyngbyei* – Algeng.
Kollstör - *Carex macloviana* – Sjaldgæf nema nokkuð víða uppi á Auðkúlu- og Eyvindarstaðaheiðum. Kirkjuhvammur á Vatnsnesi (Hólmg.Bj.), Marðarnúpur í Vatnsdal (St.St. & G.Gígja). Blöndugil, Rettabunga, Sandárstokkar og Áfangafell á Auðkúluheiði (H.Kr.). Austan Ullabungu (þ.Har.). Kurbrandsmýri, Galtarádrög og Ófuguggavatnshæðir á Eyvindarstaðaheiði (H.Kr.).
Bjúgstör - *Carex maritima* – Algeng bæði á láglandi og inni á heiðunum.
Broddastör - *Carex microglochin* – Algeng.
Mýrastör - *Carex nigra* - Mjög algeng.
Fjallastör - *Carex norvegica* – Algeng.
Belgjastör - *Carex panicea* – Algeng.
Keldustör - *Carex paupercula* – Mjög sjaldgæf, Litluborgarkatlar og Faxalækur í Vesturhópi (Hólmg. Bj.).

Hengistör - *Carex rariflora* – Mjög algeng, einkum inni á hálendinu.
Tjarnastör - *Carex rostrata* – Algeng.
Rauðstör - *Carex ruфина* – Sjaldgæf nema inni á hálendinu. Fjallið ofan við Hvammstanga (Std.). Víða á Víðidalstunguheiði, Arnarvatnsheiði, Grímstunguheiði, Auðkúluheiði og Eyvindarstaðaheiði, í Guðlaugstungum, Seyðisárdrögum og við Hveravelli.
Móastör - *Carex rupestris* – Algeng í inndölum frá Vatnsdal og austur um, einnig á öllum heiðum frá Auðkúluheiði og austur úr og suður að jöklum. Hvergi fundin þar fyrir vestan né úti á Skaga.
Marstör - *Carex ramenskii* – Sjaldgæf. Fjarðarhorn í Hrútafirði (H.Kr.) og Kálfshamarsvík á Skaga (H.Kr.).
Hrafastör - *Carex saxatilis* – Algeng.
Flæðastör - *Carex subspathacea* – Sjaldgæf, aðeins fundin á Sjávarflæðum við Fjarðarhorn í Hrútafirði (H.Kr.) og við Kerlingarbjarg á Skaga (Th.Höv.).
Slíðrastör - *Carex vaginata* – Algeng.

Grasætt

Skrautpundur - *Milium effusum* – Mjög sjaldgæfur. Hólmarnir í Friðmundarvatni vestara (H.Þorg.).
Reyrgresi - *Hierochloe odorata* – Algengt.
Ilmreyr - *Anthoxanthum odoratum* – Algengur.
Fjallafoxgras - *Phleum alpinum* – Algengt.
Vallarfoxgras - *Phleum pratense* – Algengt í byggð.
Vatnsliðagras - *Alopecurus aequalis* – Víða, bæði í byggð og á heiðunum.
Knjáliðagras - *Alopecurus geniculatus* – Allvíða í Austur-Hún. vestur í Hóp.
Háliðagras - *Alopecurus pratensis* – Algengt í byggð.
Hálingresi - *Agrostis capillaris* – Algengt.
Skríðlingresi - *Agrostis stolonifera* – Algengt.
Týtulíngresi - *Agrostis vinealis* – Algengt.
Hálmgresi - *Calamagrostis neglecta* – Mjög algengt um alla sýsluna og hálendið.
Fjallapundur - *Deschampsia alpina* – Algengur.
Beringspundur - *Deschampsia beringensis* – Slæðingur, einkum sem sáðgresi meðfram vegum. Hvammstangavegamót (H.Kr.), Meðfram Kjalvegi norðan Arnarbælis (H.Kr.), Hveravellir (Sig. Magn.& Ásr.Elm.).
Snarrótarpundur - *Deschampsia cespitosa* – Algengur.
Bugðupundur - *Avenella flexuosa* – Algengur.
Fjallalógresi - *Trisetum spicatum* – Algengt, einkum til fjalla.
Móalógresi - *Trisetum triflorum* – Mjög algengt.
Vatnsnarfagras - *Catabrosa aquatica* – Á víð og dreif um héraðið.
Axhnoðapundur - *Dactylis glomerata* – Allvíða í grennd við sáðsléttur.
Fjallasveifgras - *Poa alpina* – Algengt.
Varpasveifgras - *Poa annua* – Algengt.
Lotsveifgras - *Poa flexuosa* – Á nokkrum stöðum hátt til fjalla á Skagaströnd. Krákur (Std.), Tjarnardalafjöll og Oddnýjarhnjúkur við Langjökul (Eyp.Ein.).
Blásveifgras - *Poa glauca* – Mjög algengt.
Hjallasveifgras - *Poa x jemtlandica* – Mj.Sj. Pokafell á Skaga (H.Kr.).
Kjarrsveifgras - *Poa nemoralis* – Allvíða í Vatnsdal og þar fyrir austan. Tjörn á Skaga (H.Hg.).
Vallarsveifgras - *Poa pratensis* – Mjög algengt.
Hásveifgras - *Poa trivialis* – Allvíða á láglandi.
Varpafitjungur - *Puccinellia capillaris* – Algengur meðfram ströndinni.
Sjávarfitjungur - *Puccinellia coarctata* Víða með sjó.
Snænarfagras - *Phippsia algida* – Þrælsfell og Langihryggur á Vatnsnesi (H.Kr.), Síkárdrög í Hrútafirði (H.Kr.), Hraungarður á Víðidalstunguheiði (Ant.H.), við Öldumóðukvísl á Grímstunguheiði (H.Kr.), austan Kolkuflóa á Auðkúluheiði (Þ.Har.), Oddnýjarhnjúkur við Langjökul (Eyp.Ein.).
Túnvingull - *Festuca rubra* – Mjög algengur.

Blávingull - *Festuca vivipara* – Mjög algengur.

Hávingull - *Schedonorus pratensis* – Slæðingur á Hvammstanga (Std.).

Finnungur - *Nardus stricta* – Algengur í útsveitum, nær skammt inn í landið. Hefur hvergi fundizt á heiðunum nema í Blöndugili.

Sandfax - *Bromopsis inermis* – Sjaldgæfur slæðingur. Hvammstangi og Línakradalur.

Kjarrhveiti - *Elymus alopecurus* – Mjög sjaldgæft, Hrútey við Blönduós.

Bláhveiti - *Elymus kronokensis* – Algengt í ofanverðurm Langadal, Blöndudal, Svartárdal og Þverárdal við Bólstaðarhlíð. Hvergi fundið annars staðar.

Húsapuntur - *Elytrigia repens* – Víða við bæi og í byggð.

Melgresi - *Leymus arenarius* – Á víð og dreif, einkum í fjörum og fjörusandi og mikið meðfram vegum.

Skammstafanir heimildarmanna:

Ant. H.	Anton Helgason
A.Fedd.	Arthur Feddersen
A.Kaaber	Axel Kaaber
Ág.B.J.	Ágúst B. Jónsson
Ásr.Elm.	Ásrún Elmarsdóttir
Bergþ.Sig.	Bergþóra Sigurðardóttir
E.Þorl.	Einar Þorleifsson
Eyþ. Ein.	Eyþór Einarsson
F. Guðm.	Finnur Guðmundsson
G.Gígja	Geir Gígja
Grl.	Grønlund, Christian
Guðr. Á.J.	Guðrún Á. Jónsdóttir
Guðr. J.	Guðrún Jónsdóttir
H.Þorg.	Halldór Þorgeirsson
H.Hg.	Helgi Hallgrímsson
H.J.	Helgi Jónsson
Hfr.Sig.	Hólmfríður Sigurðardóttir
Hólmg.Bj.	Hólmgeir Björnsson
H.Stef.	Hulda Stefánsdóttir
H.Kr.	Hörður Kristinsson
I. Dav.	Ingólfur Davíðsson
J.Eyþ.	Jón Eyþórsson
Kr.Guðbr.	Kristinn Guðbrandsson
M.B.Arn.	María Birna Arnardóttir
Óli E.Bj.	Óli E. Björnsson
Sig.B.Jóh.	Sigurður B. Jóhannesson
Sig.Magn.	Sigurður H. Magnússon
Sig. P.	Sigurður Pálmason
St. Heiðm.	Starri Heiðmarsson
St.St.	Stefán Stefánsson
Std.	Steindór Steindórsson
Sv. Alb.	Sveinbjörn Albertsson
Th.Höv.	Thomas Hövelmann
Unnur Kr.	Unnur Kristinsdóttir
Vilhj.Gr.	Vilhjálmur Grímsson
Þ.Har.	Þórir Haraldsson
Æv.Pet.	Ævar Petersen