

Plöntutal – Checklist of vascular plants
Uppfærsla frá prentuðu útgáfunni 2008 í rauðu –
Updates from the printed version 2008 in red

Lycopodiaceae Jafnaætt

1. *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. – **Skollafingur** – Algengur um mestallt landið, en þó ófundinn á Suðurlandi milli Ölfusár og Markarfljóts svo og á hálendi Þingeyjarsýslna. Skiptist í þrjár deilitegundir sem allar eru hér á landi, subsp. **appressa** (Bach.Pyl ex Desv.) D. Löve ex Tzvelev, subsp. **selago** og subsp. **arctica** (Grossh. ex Tolm) Á.Löve & D.Löve. Sú fyrstnefnda er langalgengust, subsp. **selago** fremur sjaldgæf á Suður- og Vesturlandi, en subsp. **arctica** er sjaldgæf, aðeins fundin við Eyjafjörð. Í norsku flórunni eru þær taldar sjálfstæðar tegundir.¹⁹
2. *Lycopodium annotinum* L. – **Lyngjafni** – Víða á vestanverðu landinu, einnig sums staðar í útsveitum á Norðurlandi og frá Reyðarfirði norður að Unaósi á Austfjörðum. Annars staðar sjaldgæfur eða vantar. Tvær deilitegundir af lyngjafna eru hér á landi, subsp. **alpestre** (Hartm.) Á.Löve & D.Löve¹¹⁹ sem er algengari, og subsp. **annotinum** sem einkum finnst á Norðurlandi og á Vestfjörðum.¹¹⁹
3. *Lycopodium clavatum* L. – **Burstajafni** – Mj. sj., aðeins á einum stað í Breiðdal á Austfjörðum.²⁵
4. *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub – **Litunarjafni** – Algengur á láglandi neðan 500 m í snjóðældum í útsveitum, sjaldgæfari inn til landsins og mj. sj. á Suðurlandi frá Þjórsá austur í Hornafjörð.

Selaginellaceae Mosajafnaætt

5. *Selaginella selaginoides* (L.) P.Beauv. ex Schrank. – **Mosajafni** – Algengur um land allt.

Isoetaceae Álftalauksætt

6. *Isoetes echinospora* Durieu – **Álftalaukur** – Vatnajurt sem fundist hefur í tjörnum á víð og dreif um landið nema á Miðhálandinu.
7. *Isoetes lacustris* L. – **Vatnalaukur** – Sjaldgæf vatnajurt sem fundist hefur á nokkrum stöðum á suðvestanverðu landinu.^{143, 146}

Equisetaceae Elftingarætt

8. *Equisetum arvense* L. – **Klóelfting** – Mjög algeng um allt land, bæði á láglandi og allhált til fjalla. Tvær deilitegundir finnast hér, subsp. **arvense** er algeng á láglandi og í byggð, en subsp. **boreale** (Bong.) Á.Löve vex jafnt hátt til fjalla sem einnig á láglandi.¹¹⁹
9. *Equisetum fluviatile* L. – **Fergin** – Algengt um allt land nema hátt til fjalla, strjált á Vestfjörðum.
10. *Equisetum hyemale* L. – **Eski** – Allalgengt um mestallt land, sums staðar þó mjög strjált.
11. *Equisetum palustre* L. – **Mýrelfting** – Algeng í deiglandi um allt land nema hátt til fjalla.
12. *Equisetum pratense* Ehrh. – **Vallelfting** – Algeng um allt land nema á miðhálandinu og hátt til fjalla.
13. *Equisetum sylvaticum* L. – **Skógelfting** – Mjög sjaldgæf, aðeins fundin á þrem svæðum, Heydal^{66, 79} og Ingólfsfirði á Vestfjörðum, og í Sandvík við Gerpi.²²
14. *Equisetum variegatum* Schleich. ex Weber & Mohr – **Beitieski** – Mjög algengt um allt land.

Ophioglossaceae Naðurtunguætt

15. *Ophioglossum azoricum* C.Presl. – **Naðurtunga** – Sjaldgæf, nær eingöngu við jarðhita á móbergssvæðunum.
16. *Botrychium boreale* Milde – **Mánajurt** – Sjaldgæf, fundin dreifð um norðurhelming landsins suður að Arnarfellsbrekku við Hofsjökul.⁷¹
17. *Botrychium lanceolatum* (S.G.Gmel.) Ångstr. – **Lensutungljurt** – Mjög strjál, en dreifð um landið.
18. *Botrychium lunaria* (L.) Sw. – **Tungljurt** – Algeng um allt land.
19. *Botrychium minganense* Victorin, Proc. & Trans. – **Keilutungljurt** – Mjög sjaldgæf, fundin á örfáum stöðum, einkum um landið sunnanvert.^{65,134}
20. *Botrychium simplex* E.Hitchc. – **Dvergtungljurt** – Tvö afbrigði hafa verið staðfest hér, var. **simplex** og var. **tenebrosum** (A.A.Eaton) R.T.Clausen, *renglutungljurt*. Afbrigðið var. *simplex* er allvíða

meðfram suðausturströnd landsins í snöggu, sendnu graslendi, sjaldgæft annars staðar.¹⁴⁸ Hitt afbrigðið, var. *tenebrosum* vex allvíða um suðaustanvert landið frá Meðallandi austur í Suðursveit, og einnig sunnan á Reykjanesskaganum.^{65,134} Annars staðar sjaldgæft.

Pteridaceae Vængburknaætt

21. *Cryptogramma crispa* (L.) R.Br. ex Hook. – **Hliðaburkni** – Sjaldgæfur, aðeins fundinn á tveim svæðum á Vestfjörðum, á Snæfjallaströnd og við Hesteyrarfjörð.⁴

Hymenophyllaceae Mosaburknaætt

22. *Hymenophyllum wilsonii* Hook. – **Mosaburkni** – Mj. sj., aðeins fundinn á einum stað í Deildarargili í Mýrdal 1974.¹³ Hefur ekki sést þar aftur síðari ár.

Aspleniaceae Klettburknaætt

23. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – **Skeggburkni** – Mjög sjaldgæfur, aðeins fundinn í Höfðahverfi við Eyjafjörð.¹⁵⁰
24. *Asplenium trichomanes* L. – **Svartburkni** – Mjög sjaldgæfur, fundinn á fjórum stöðum, í Skaftafelli,²³ Núpakoti og Moldnúpi undir Eyjafjöllum og Krossbæ í Hornafirði. Öll eintökin eru nú talin tilheyra deilitegundinni subsp. **trichomanes** en ekki subsp. **quadrialeans** D.E. Mey. eins og áður var talið.
25. *Asplenium viride* Huds. – **Klettburkni** – Sjaldgæfur, fundinn á átta stöðum á austanverðu landinu frá Reykjaheiði við Kelduhverfi suður í Kvísker.^{36, 58}

Woodsiaceae Liðfælluætt

26. *Athyrium distentifolium* Tausch ex Opiz – **Púsunndlaðarós** – Víða á snjóþyngstu láglandissvæðum landsins, nyrst á Austfjörðum, útsveitum við Eyjafjörð, Vestfjörðum og norðan á Snæfellsnesi.
27. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – **Fjöllaufungur** – Allvíða á vestanverðu landinu frá Vestfjörðum suður undir Eyjafjöllum, sjaldgæfur með ströndum austan lands.
28. *Woodsia alpina* (Bolton) Gray – **Fjallaliðfætla** – Sjaldgæf, fundin hér og hvar á Vesturlandi og Suðurlandi frá Snæfellsnesi austur fyrir Hornafjörð, annars mjög sjaldséð.
29. *Woodsia ilvensis* (L.) R.Br. – **Liðfætla** – Allvíða á Vesturlandi og Vestfjörðum sunnanverðum, Suðurlandi og Austfjörðum. Sjaldgæf á Norðurlandi og Fljótsdalshéraði.
30. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – **Tófugras** – Algengt um allt land. Plöntur af tófugrasi með afbrigðileg gró hafa stundum verið taldar til sérstakrar deilitegundar (subsp. **dickiana**) eða jafnvel tegundar. Líklegur er þó talið, að hér sé aðeins um arfgengan eiginleika innan tegundarinnar að ræða.¹¹⁹
31. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – **Þrílaufungur** – Algengur eða allvíða á Vesturlandi og Vestfjörðum, einnig í útsveitum á Miðnorðurlandi og á Austfjörðum. Annars staðar sjaldgæfur.

Dryopteridaceae Skjaldburknaætt

32. *Dryopteris expansa* (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy – **Dílaburkni** – Allalgengur á Vestfjörðum, á nokkrum stöðum á Reykjanesskaga og Snæfellsnesi, sjaldgæfur á Norðurlandi.
33. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – **Stóriburkni** – Allvíða á Vesturlandi og Vestfjörðum,
34. *Polystichum lonchitis* (L.) Roth – **Skjaldburkni** – Algengur þar sem snjóþungt er á Vestfjörðum, miðju Norðurlandi og Austfjörðum. Sjaldgæfur annars staðar, og aðeins á einum stað á Suðurlandi frá Ölfusá austur að Skeiðará.

Thelypteridaceae Þríhyrnuburknaætt

35. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt – **Þríhyrnuburkni** – Allvíða á vestanverðu landinu, sjaldgæfur annars staðar. **Blechnaceae Skollakamsætt**
36. *Blechnum spicant* (L.) Roth – **Skollakambur** – Sjaldgæfur, bundinn við snjóþung láglandissvæði¹⁶² eins og milli Fáskrúðsfjarðar og Borgarfjarðar á Austfjörðum, útsveitir Eyjafjarðar, ákveðna hluta Vestfjarða og norðan á Snæfellsnesi. Jarðhitaafbrigði af skollakambi gengur undir nafninu var. **fallax** Lange, *tunguskollakambur*. Það er mjög sjaldgæft, aðeins á örfáum jarðhitasvæðum.⁸

Polypodiaceae *Köldugrasætt*

37. *Polypodium vulgare* L. – *Köldugras* – Algengt á láglandi frá Vesturlandi um Suðurland og norður til Reyðarfjarðar á Austfjörðum. Sjaldgæft á Norðurlandi.

Pinaceae *Furuætt*

38. *Pinus contorta* Douglas ex Loudon – *Stafafura* – Innflutt til skógræktar einkum eftir 1960, en kom fyrst svo vitað sé um 1930.¹⁵ Hún hefur sáð sér út á nokkrum stöðum í Eyjafirði,¹⁵ og mun sums staðar vera orðin ílend.^{1, 129, 134}
39. *Picea sitchensis* (Bong.) Carrière – *Sitkagreni* – Innflutt til skógræktar og er farið að sá sér út allvíða á Suðurlandi frá Elliðaárdal.¹²⁹ austur í Kirkjubæjarklaustur,^{1, 134, 154} og einnig á Hallormsstað.
40. *Larix sibirica* Ledeb. – *Siberiulerki* – Innflutt til skógræktartilrauna frá 1922, og notað víða til gróðursetningar á síðari hluta 20. aldar,³² og hefur á nokkrum stöðum sáð sér út á síðari árum.¹⁵⁴ Og kemur væntanlega til með að ílendast.
- Pinus aristata* Engelm. – *Broddfura* – Innflutt til skógræktar allt frá 1905,³² og hefur sáð sér út á Hallormsstað.¹⁵⁴
- Pinus cembra* L. – *Lindifura* – Innflutt til skógræktar fyrst um aldamótin 1900,¹⁵ en hefur síðar sáð sér út á Hallormsstað.¹⁵⁴
- Pinus mugo* Turra – *Fjallafura* – Innflutt til skógræktar frá því í byrjun 20. aldar, en óvíst hvaðan.³² Hún hefur eitthvað sáð sér út á Þingvöllum.¹⁵⁴
- Pinus sylvestris* L. – *Skógarfura* – Allmikið notuð í skógrækt frá 1959.¹³⁵ og er byrjuð að sá sér út í Vaðlaskógi.¹³⁴
- Picea abies* (L.) H.Karsten – *Rauðgreni* – Innflutt til skógræktar fyrst 1902, en einkum þó eftir 1947.³² Er eitthvað farið að sá sér út, a.m.k. á Hallormsstað.¹⁵⁴
- Picea engelmannii* Parry ex Engelm. – *Blágreni* – Innflutt frá Alaska á fyrri hluta 20. aldar til skógræktar³² og er byrjað að sá sér út í Mörkinni á Hallormsstað.¹⁵⁴
- Abies lasiocarpa* (Hooker) Nutt. – *Fjallapínur* – Innfluttur í byrjun 20. aldar til skógræktartilrauna.¹³⁵ Farinn að sá sér töluvert út í Mörkinni á Hallormsstað.¹⁵⁴

Cupressaceae *Einisætt*

41. *Juniperus communis* L. – *Einir* – *Tvær deilitegundir finnast hér, subsp. communis og subsp. nana* (Willd.) Syme. *Sú síðarnefnda er algengust*, víða um land nema sjaldgæf í Húnavatnssýslu norður að Steingrímsfirði, og á Suðurlandi frá Þjórsá austur í Fljótshverfi. Vantar einnig á miðju Miðhálandinu. *Subsp. communis er sjaldgæf, einkum fundin á um norðanvert landið.*

Salicaceae *Víðisætt*

42. *Salix alaxensis* (Anderss.) Coville – *Alaskavíðir* – Aðfluttur en algengur í ræktun, einkum skjólbeltarækt. Er víða farinn að sá sér á eigin spýtur¹²² og má teljast ílendur.
43. *Salix arctica* Pall. – *Fjallavíðir* – Algengur um land allt, síst þó á láglandi sunnanlands.
44. *Salix caprea* L. – *Selja* – Ræktuð á allmörgum stöðum, hefur sáð sér út á fáeinum stöðum t.d. á Egilsstöðum og í Grafarvogi og Kollafirði á höfuðborgarsvæðinu.¹²²
45. *Salix herbacea* L. – *Grasvíðir* – Algengur um land allt.
46. *Salix lanata* L. – *Loðvíðir* – Algengur um land allt.
47. *Salix myrsinifolia* Salisb. subsp. borealis (Fr.) Hyl. – *Víðja* – Fyrst flutt inn um 1940.¹³⁵ síðar allmikið í ræktun í görðum og skjólbeltum, sáir sér mjög auðveldlega út.¹²² Skráðar sjálfsáningar eru mest á þrem svæðum, Suðvesturlandi, við Eyjafjörð og á Fljótsdalshéraði.¹³⁴
48. *Salix phylicifolia* L. – *Gulvíðir* – Algengur um land allt.
49. *Populus tremula* L. – *Blæðsp* – Mjög sjaldgæf, innlend tegund, aðeins fundin villt á Norður- og Austurlandi.^{21, 54, 91} Hefur auk þess verið ræktuð víðar og dreifir sér þar með rötarteinungum.
50. *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook. – *Alaskaösp* – Innflutt til skógræktar frá Alaska árið 1944³² og er víða farin að sá sér út, einkum í Eyjafirði, Skorradal og á Suður- og Suðvesturlandi.^{124, 134}
- Salix pentandra* L. – *Gljávíðir* – Ræktaður, en eitthvað farinn að sá sér út.¹²⁸

Betulaceae *Bjarkarætt*

51. *Betula nana* L. – *Fjalldrapi* – Algengur um allt land nema ófundinn á Suðausturlandi frá Eyjafjöllum austur að Núpsstað.
52. *Betula pubescens* Ehrh. – *Birki* – Algengt um allt land nema sjaldgæft í Vestur-Húnavatnssýslu og sunnanverðri Strandasýslu.
53. *Alnus sinuata* (Regel) Rydb. – *Sitkaölur* – Innfluttur til skógræktar og hefur sáð sér nokkuð út, einkum í Stjórnarsandi við Kirkjubæjarklaustur, Skógey við Hornafjörð,¹⁵⁴ en einnig í Elliðaárdal,¹²⁹ Hveragerði og á Reyðarfirði.
- Alnus incana* (L.) Moench – *Gráödur* – Innfluttur fyrst upp úr aldamótunum 1900¹⁵ en síðan til skógræktar á sjötta áratug síðustu aldar.¹³⁵ Sáir sér ekki út, en skriður, og getur sennilega haldist við þannig til lengdar, m.a. í Elliðaárdal¹²⁹ og á Keldum.

Urticaceae *Netluætt*

54. *Urtica dioica* L. – *Brenninetla* – Hefur verið ræktuð víða a.m.k. síðan 1890 en líklega miklu lengur, og verið flutt á milli staða, vex víða sem eftirlega en dreifist ekki mikið^{30, 74, 85, 137}.
55. *Urtica urens* L. – *Smánetla* – Hefur fundist allvíða um landið á ýmsum tímum, mest við suðvesturströndina. Vex einkum í fjörum eða matjurtagörðum. Engir fundir eru þekktir á Suðausturlandi frá Eyjafjöllum að Reyðarfirði. ^{48, 112, 140, 145}

Cannabaceae *Hampætt*

Cannabis sativa L. – *Hampjurt* – Mjög sjaldgæfur slæðingur, Örfirisey 1966.¹³⁴

Polygonaceae *Súruætt*

56. *Rumex acetosa* L. subsp. *acetosa* – *Túnsúra* – Algeng um land allt. Tvær deilitegundir hafa verið aðgreindar hér,¹¹⁹ subsp. *acetosa* sem einkum vex á láglendi við bæi og talin er aðflutt við landnám og subsp. *islandicus* (Á.Löve) O. Nilsson sem er innlend og er bæði á láglendi og til fjalla.
57. *Rumex acetosella* L. – *Hundasúra* – Algeng á Suður- og Vesturlandi, annars staðar víða nema á Vestfjörðum, Norðausturlandi og Miðhálandinu. Skipt niður í þrjár deilitegundir, og er lítið vitað um útbreiðslu þeirra hvernar um sig:¹¹⁹ subsp. *acetosella*, subsp. *tenuifolius* (Wallr.) O.Schwarz smásúra og subsp. *arenicola* Mäkinen ex Elven.
58. *Rumex longifolius* DC. – *Njóli* – Algengur í byggð um mest allt landið.
59. *Oxyria digyna* (L.) Hill – *Ólafssúra* – Algeng um allt land, einkum til fjalla.
60. *Persicaria amphibia* (L.) Gray – *Tjarnablaðka* – Mj. sj. vatnajurt, hefur fundist í þrem vötnum:¹³⁴ Við Hofgarða á Snæfellsnesi, í Gaulverjabæjartjörn í Flóa þar sem hún nú er út dauð, og að lokum í Kakkarvatni í Flóa.
61. *Persicaria maculosa* Gray – *Flóajurt* – Allvíða við jarðhita, einkum á Suður- og Suðvesturlandi. ¹³⁷ Aðeins á fáum stöðum sem slæðingur í köldum jarðvegi.¹³⁴
62. *Bistorta vivipara* (L.) Delarbre – *Kornsúra* – Mjög algeng um allt land í flestum gróðurlendum.
63. *Koenigia islandica* L. – *Naflagras* – Algengt um allt land nema á hálandinu vestan Jökulsár á Fjöllum.
64. *Polygonum aviculare* L. – *Blóðarfi* – Algengur í byggð kringum landið, sjaldgæfur annars staðar. Tvær deilitegundir eru þekktar héðan,¹¹⁹ subsp. *boreale* (Lange) Karlsson sem er algeng í byggð og subsp. *neglectum* (Besser) Arcang. sem hefur verið staðfest frá einum stað og er væntanlega innfluttur slæðingur.¹¹⁹
- Rumex crispus* L. – *Hrukkunjóli* – Sjaldgæfur slæðingur, ^{111, 139} einkum fundinn í nágrenni Reykjavíkur, ⁹² en einnig í Hnífsdal⁴⁸ og á Akureyri. ¹³⁴
- Rumex obtusifolius* L. subsp. *sylvestris* (Wallr.) Čelak – *Borgarnjóli* – Sjaldgæfur slæðingur sem hefur fundist á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu, Vestfjörðum og á Norðurlandi.^{108, 151}
- Rumex stenophyllus* Ledeb. – *Akurnjóli* – Mj. sj. slæðingur sem fannst á Akureyri um 1950.^{111, 134, 141}
- Rumex thyrsiflorus* Fingerh. – *Skúfasúra* – Mj. sj. slæðingur á Fljótsdalshéraði 2003⁶⁴.
- Rumex triangulivalvis* (Danser) Rech.f. – *Bugðunjóli* – Mj. sj. slæðingur sem fannst á Gleráreyrum, Akureyri rétt eftir 1950.^{111, 134, 149}
- Rheum x rhabarbarum* L. – *Rabbarbari* – Víða ræktaður við bæi, langlífur í yfirgefnum garðlöndum, en dreifir sér ekki.

- Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve – *Vafsúra* – Slæðingur sem fundist hefur víða um land allt síðan 1888 og sums staðar vaxið á sama stað árum saman.^{74, 137, 139, 147}
- Fallopia sachalinensis (F.Schmidt ex Maxim.) Ronse Decr. – *Risasúra* – Sjaldgæfur slæðingur á Norðfirði og í Mjóafirði 1949–1966.^{100, 111, 134}
- Persicaria lapathifolia (L.) Gray – *Lóblaðka* – Sjaldgæfur slæðingur sem fundist hefur á nokkrum stöðum á Suðvesturlandi og Norðurlandi.^{74, 120, 134}
- Bistorta officinalis Delarbre – *Slöngusúra* – Slæðingur á Siglufirði frá 1954–1963.¹¹¹
- Aconogonum alpinum (All.) Schur – *Snæsúra* – Innflutt garðjurt af súruætt, slæðingur í Elliðaárdal.¹²⁹
- Fagopyrum esculentum Moench – *Bókhveiti* – Slæðingur sem fundist hefur í allmörgum kaupstöðum á landinu frá 1944 til 1973.^{117, 147}
- Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. – *Tatarabókhveiti* – Mj. sj. slæðingur, aðeins fundinn í Reykjavík 1945.^{96, 111}

Plumbaginaceae *Gullintoppuætt*

65. *Armeria maritima* (Miller) Willd. – *Geldingahnappur* – Algengur um land allt.

Chenopodiaceae *Hélunjólaætt*

66. *Atriplex glabriuscula* Edmonston – *Hrímblaðka* – Algeng með ströndum landsins, vex eingöngu í sand- og malarfjörum.
- ~~67. *Atriplex longipes* Drejer subsp. *praecox* (Hülph.) Turesson – *Hélublaðka* – Talin vaxa hér, staðfest frá Breiðdalsvík,¹¹⁹ en alls er óvíst með útbreiðslu hennar annars staðar þar sem hún er torgreind frá hrímblaðku nema með vel þroskuðum aldinum.~~
- Atriplex littoralis* L. – *Þanghrímblaðka* – Á fjörukambi við Ytra-Krossanes, Eyjafirði árið 1985. Ungar fræplöntur nýlega greindar af Reidar Elven.
- Atriplex patula* L. – *Akurhrímblaðka* – Mjög sjaldgæfur slæðingur á Oddeyri 1945.¹³⁴ Íslenska hrímblaðkan var áður talin til þessarar tegundar¹³⁹ en nú er hún talin vera *A. glabriuscula*.
- Chenopodium album* L. – *Hélunjóli* – Finnst alltaf öðru hverju sem slæðingur í byggð og þéttbýli, en ílendist ekki til lengdar.¹¹¹
- Chenopodium berlandieri* Moq. – *Texasnjóli* – Mj. sj. slæðingur á Akureyri 1950.^{134, 119}
- Chenopodium murale* L. – *Nettunjóli* – Mj. sj. Slæðin L.gur á Akureyri 1946.^{119, 134}
- Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz – *Hærunjóli* – Mj. sj. slæðingur á Akureyri 1951.^{111, 134, 147}
- Chenopodium pratericola* Rydb. – *Gæsanjóli* – Mj. sj. slæðingur á Akureyri 1950 og 1951.^{111, 134, 147}
- Chenopodium suecicum* Murr – *Svíanjóli* – Mj. sj. slæðingur í Öxarfirði og Hveragerði 1963 og 1964.¹¹⁹
- Suaeda maritima* (L.) Dumort. – *Salturt* – Sjaldgæfur slæðingur, aðeins í Reykjavík.¹¹¹
- Salsola tragus* L. – *Þornurt* – Slæðingur á Akureyri um 1950.^{111, 147}

Portulacaceae *Grýtuætt*

67. *Montia fontana* L. – *Lækjagrýta* – Algeng um land allt við læki og lindir.
- Claytonia sibirica* L. – *Rósagrýta* – Slæðingur á Seyðisfirði og nágrenni.⁶⁴ Ræktuð í gördum, og dreifist auðveldlega þaðan.

Caryophyllaceae *Hjartagrasætt*

68. *Spergula arvensis* L. subsp. *sativa* (Mert. & W.D.J.Koch) Čelak – *Skurfa* – Algeng á Suðvesturlandi frá Hvammsfirði að Mýrdal, einnig víða frá Örafum norður í Reyðarfjörð. Annars staðar sjaldgæfur slæðingur.
69. *Spergularia salina* J. & C.Presl – *Flæðaskurfa* – Mjög sjaldgæf, aðeins fundin í Langey, Purkey⁸⁸ og á Langeyjarnesi⁸⁹ við Breiðafjörð.
70. *Sagina caespitosa* (J.Vahl) Lange – *Fjallkrækill* – Sjaldgæfur, mest á Norðausturlandi^{54, 67, 71} en fundinn í flestum landshlutum.
71. *Sagina nivalis* (Lindblad) Fries – *Snækrækill* – Algengur til fjalla og á miðhálandinu.
72. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl subsp. *borealis* G.E. Crow – *Hnúskakrækill* – Algengur á láglandi, sjaldgæfur á hálandinu.
73. *Sagina procumbens* L. – *Skammkrækill* – Algengur um land allt.

74. *Sagina saginoides* (L.) H.Karsten – **Langkrækill** – Algengur, einkum norðanlands og á miðhálandinu.
75. *Sagina subulata* (Swartz) C. Presl – **Broddkrækill** – Víða við sjó á Vesturlandi og Vestfjörðum, einnig á Austfjörðum frá Vopnafirði suður í Lón. Ófundinn annars staðar.
76. *Minuartia biflora* (L.) Schinz & Thell. – **Fjallanóra** – Víða til fjalla um meiri hluta landsins, þó sjaldséð á Suðvestur- og Suðurlandi.
77. *Minuartia rubella* (Wahlenb.) Hiern – **Melanóra** – Algeng um land allt.
78. *Minuartia stricta* (Swartz) Hiern – **Móanóra** – Fremur strjál, en finnst vítt og breitt inn til landsins og á hálandinu á Norður- og Austurlandi.
79. *Honkenya peploides* (L.) Ehrh. subsp. **diffusa** (Hornem.) Hultén – **Fjöruarfi** – Algengur í fjörum kringum landið.
80. *Arenaria norvegica* Gunn. – **Skeggsandi** – Víðast algengur, nema sjaldgæfur á norðanverðum Vestfjörðum.
81. *Stellaria alsine* Grimm – **Bakkaarfi** – Mj. sj., aðeins fundinn á einum stað árið 2006.¹³³ Ekki fullljóst hvort hér er um aðflutta eða innlenda tegund að ræða.
82. *Stellaria borealis* Bigelow – **Línarfi** – Sjaldgæfur, mest innarlega við Djúp á Vestfjörðum, en fundinn á nokkrum stöðum öðrum, einkum á Norðurlandi.^{48, 134}
83. *Stellaria crassifolia* Ehrh. – **Sjörnuarfi** – Allvíða um landið, einkum á Norðurlandi.
84. *Stellaria graminea* L. – **Akurarfi** – Algengur og löngu ílendur í byggðum landsins. ^{71, 111}
85. *Stellaria humifusa* Rottb. – **Lágarfi** – Víða um land allt á sjávarfitjum, nema ófundinn á Suðurlandi frá Reykjanesskaga að Örafum.
86. *Stellaria media* (L.) Vill. – **Haugarfi** – Algengur um land allt nema óvíða á Miðhálandinu.
87. *Cerastium alpinum* L. – **Músareyra** – Mjög algengt um land allt bæði á láglandi og hæst til fjalla. Þrjár deilitegundir eru taldar vera hér: subsp. **alpinum** og subsp. **lanatum** (Lam.) Ces., *loðeyra*, eru algengar um land allt, subsp. **glabratum** (Hartman) Á. & D.Löve, *snoðeyra*, hefur fundist hér og hvar en strjált um norðurhelming landsins.
88. *Cerastium cerastoides* (L.) Britton – **Lækjafræhyrna** – Algeng, einkum til fjalla.
89. *Cerastium fontanum* Baumg. – **Vegarfi** – Algengur á láglandi. Tvær deilitegundir eru hér á landi¹²⁰, subsp. **fontanum** sem er innlend og algeng og subsp. **vulgare** (Hartm.) Greuter & Burdet sem talin er aðflutt með mannum og vex einkum í grennd mannbústaða.
90. *Cerastium glomeratum* Thuill. – **Hnoðafrahyrna** – Allvíða á Suðvestur- og Suðurlandi allt austur til Suðursveitar og Hornafjarðar⁹⁹, einkum á jarðhitasvæðum.
91. *Cerastium nigrescens* (H.C.Watson) Edmondston var. **laxum** (Lindblad) Brysting & Elven – **Fjallafræhyrna** – Algeng hátt til fjalla, vantar á láglandi.
92. *Viscaria alpina* L. – **Ljósberi** – Víða eða algengur um land allt.
93. *Lychnis flos-cuculi* L. – **Munkahetta** – Víða á svæðinu frá Fljótshlíð⁵¹ austur í Mýrdal, einnig í Örafum. Annars staðar mjög sjaldgæf og aðeins sem slæðingur.¹⁰¹
94. *Silene acaulis* (L.) Jacq. – **Lambagras** – Algengt um land allt.
95. *Silene dioica* (L.) Clairv. – **Dagstjarna** – Ræktuð til skrauts, sáir sér mikið út og er víða orðin ílend.^{111, 134}
96. *Silene uniflora* Roth – **Holurt** – Algeng um mestallt landið.
- Cerastium biebersteinii* DC. – **Rottueyra** – Ræktuð sem skrautjurt, slæðingur í Elliðaárdal.¹²⁹
- Agrostemma githago* L. – **Akurstjarna** – Sást sem slæðingur á nokkrum stöðum frá 1890 til 1976.^{111, 137, 139} Hefur ekki verið skráð í seinni tíð, er líklega á undanhaldi.
- Silene latifolia* Poir. subsp. **alba** (Miller) Greuter & Burdet – **Aftanstjarna** – Víða ræktuð í gördum, slæðingur á þrem stöðum.¹³⁴
- Silene noctiflora* L. – **Rökkurstjarna** – Slæðingur á Oddeyri 1953.^{111, 149}
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke – **Garðaholurt** – Víða í ræktun í gördum, hefur sáð sér út á nokkrum stöðum. ^{17, 111, 134}
- Vaccaria hispanica* (Miller) Rauschert – **Kúajurt** – Mj. sj. slæðingur í Reykjavík 1948–50.^{92, 111}

Nymphaeaceae Vatnaliljuætt

- Nuphar pumila* (Timm) DC. – **Dvergvatnalilja** – Mj. sj., upphaflega gróðursett í Djáknatjörn í Krossanesborgum eftir 1970, og hefur dafnað þar síðan.⁶³

Ranunculaceae *Sóleyjaætt*

97. *Caltha palustris* L. – *Hófsóley* – Algeng á láglandi um land allt.
98. *Thalictrum alpinum* L. – *Brjóstagras* – Algengt um land allt.
99. *Ranunculus auricomus* L. – *Sifjarsóley* – Sjaldgæf, aðeins fundin í útsveitum á Austurlandi, ^{21, 45} miðju Norðurlandi,^{24, 31} Vestfjörðum og Snæfellsnesi. ¹⁴⁹
100. *Ranunculus confervoides* (Fr.) Fr. – *Lónasóley* – Algeng um land allt í vötnum og tjarnapollum.
101. *Ranunculus glacialis* L. – *Jöklasóley* – Algeng til fjalla á blágrýtissvæðum landsins, ófundin á móbergssvæðinu sunnan jökla og sjaldgæf á því norðan jökla.
102. *Ranunculus hyperboreus* Rottb. – *Trefjasóley* – Víða um allt land.
103. *Ranunculus pygmaeus* Wahlenb. – *Dvergsóley* – Algeng hátt til fjalla, hvergi á láglandi.
104. *Ranunculus repens* L. – *Skriðsóley* – Allvíða í byggð og á gömlum eyðibýlum.
105. *Ranunculus reptans* L. – *Flagasóley* – Algeng um land allt.
106. *Ranunculus subborealis* Tzvelev – *Brennisóley* – Algeng um land allt. Íslenskum eintökum hefur verið skipt í tvær deilitegundir, ^{120,19} subsp. *villosus* (Drabble) Elven sem er algengust á láglandi, og subsp. *pumilus* (Wahlenb.) Elven sem einkum vex til fjalla.
- Aconitum x stoerkianum* Reichenb. – *Fagurhjálmur* – Ræktaður í skrudgördum, slæðingur í Elliðaárdal
- Aconitum napellus* L. subsp. *lusitanicum* Rouy – *Venusvagn* – Ræktaður í gördum, helst stundum lengi utangarðs, t.d. í Reykjavík og á Seyðisfirði.¹³⁴
- Anemone nemorosa* L. – *Skógarsóley* – Aðflutt í Ásbyrgi³³ og Vaglaskógi fyrir 1990. Hefur dreift sér og ílenst í Ásbyrgi, en mun vera horfin aftur úr Vaglaskógi.
- Ranunculus aconitifolius* L. – *Sifursóley* – Ræktuð í skrudgördum, slæðingur í Elliðaárdal.¹²⁹

Papaveraceae *Draumsóleyjaætt*

107. *Papaver croceum* Ledeb. – *Garðasól* – Víða ræktuð, sáir sér auðveldlega út og víða orðin ílend.
108. *Papaver radicum* Rottb. – *Melasól* – Algeng á Vestfjörðum og Austfjörðum, einnig allvíða á vestanverðu landinu suður að Skarðsheiði og austur á Skaga. Hátt til fjalla í innsveitum Eyjafjarðar og Skagafjarðar allt suður í Ásbjarnarfell. Sjaldgæf annars staðar. Af melasól eru taldar þrjár deilitegundir hér á landi,¹²⁰ subsp. *radicum* með gul blóm sem algengust er á Vestfjörðum og Norðurlandi, subsp. *stefanssonii* (Á.Löve) Jonsell & Ö.Nilsson, *stefánsól*, sem hefur hvít eða bleik blóm og er sjaldgæf á Vestfjörðum og vestanverðu Norðurlandi, og að lokum subsp. *steindórssonianum* (Á.Löve) Knaben ex Ö. Nilsson en það er allur Austfjarðastofninn sem er með gulum blómum.¹²⁰
- Papaver somniferum* L. – *Draumsól* – Sj. slæðingur sem alloft barst með fræi í sáðlönd bænda, einkum um miðbik síðustu aldar,^{146, 147} en helst ekki til lengdar. Hefur lítið sést á síðari árum.

Fumariaceae *Reykjurtaætt*

- Fumaria officinalis* L. – *Reykjurt* – Mjög sjaldgæfur slæðingur, fannst í Reykjavík 1951.^{79, 111}

Brassicaceae *Krossblómaætt*

109. *Arabis petraea* (L.) – *Melablóm* – Mjög algengt um allt land.
110. *Erysimum strictum* P.Gaertn., B. Mey. & Scherb. – *Aronsvöndur* – Allvíða á Vesturlandi frá Þjórsá norður á Vestfirði og einnig frá Eyjafirði um Suður-Þingeyjarsýslu í Mývatnssveit. Annars staðar sjaldgæfur. Algengastur í Mývatnssveit við strendur vatnsins og í hólum, annars mest í klettum einkum við hreiðurstaði fugla.
111. *Barbarea stricta* Andr. – *Hlíðableikja* – Slæðingur sem hefur breiðst út allvíða og ílenst á höfuðborgarsvæðinu og í Eyjafirði síðan 1969.¹¹⁴
112. *Rorippa islandica* (Oeder & Murray) Borbas – *Kattarjurt* – Útbreidd á Suðvesturlandi frá Hvalfirði að Þjórsá, og einnig á miðju Norðurlandi frá Fljótum austur í Óxarfjörð. Sjaldgæf annars staðar.
113. *Cardamine bellidifolia* L. – *Jöklaklukka* – Fremur sjaldgæf, á víð og dreif um landið til fjalla nema á Suðurlandi.
114. *Cardamine hirsuta* L. – *Lambaklukka* – Algeng á Suðvesturlandi frá Borgarfirði austur í Örafi, annars staðar sjaldgæf.

115. *Cardamine pratensis* L. subsp. *angustifolia* (Hook.) O.E. Schulz – **Hrafnaklukka** – Algeng um land allt.
116. *Arabis alpina* L. – **Skriðnablóm** – Algengt um allt land, einkum í giljum og gljúfrum.
117. *Draba arctogena* (E.Ekman) E.Ekman – **Heiðavorblóm** – Algengt til fjalla á norðanverðu landinu og á hálendinu. Þessi tegund hefur fram til þessa verið talin til *Draba norvegica*^{60, 139} eða *Draba fladnizensis*.⁶
118. *Draba glabella* Pursh. – **Túnvorblóm** – Víða um land, sjaldgæfari á Suðvesturlandi en í öðrum landshlutum. Tegund þessi hefur áður verið talin með *Draba norvegica*,^{60, 139} eða verið nefnd *Draba daurica*.⁶
119. *Draba incana* L. – **Grávorblóm** – Algengt um land allt nema á Miðhálandinu.
120. *Draba lactea* Adams – **Snoðvorblóm** – Hefur fundist allvíða á landræna svæðinu norðan jökla, annars staðar sjaldgæft. Hefur áður oft ekki verið aðgreint frá hagavorblómi.
121. *Draba nivalis* Liljeblad – **Héluvorblóm** – Dreift um landræna svæðið norðan jökla, en mjög strjált.
122. *Draba norvegica* Gunn. – **Hagavorblóm** – Því sem áður var talið til þessarar tegundar á Íslandi⁶⁰ eða til *D. rupestris*¹³⁹ hefur nú verið skipt upp í þrjár tegundir,¹⁹ og er enn óvíst um hvort *Draba norvegica sensu stricto* sé til í landinu eða ekki.
123. *Draba oxycarpa* Sommerf. – **Fjallavorblóm** – Hér og hvar um Miðhálandið, einkum norðan til, og hátt til fjalla á Norður- og Austurlandi.
124. *Draba verna* L. – **Vorperla** – Algeng á Fljótsdalshéraði og frá Norðurlandi vestur í Breiðafjörð, annars staðar mjög sjaldgæf.
125. *Cochlearia officinalis* L. – **Skarfakál** – Algengt í sjávarklettum kringum landið.
126. *Cochlearia groenlandica* L. – **Fjallaskarfakál** – Fremur sjaldgæft, fundið á allmörgum stöðum hátt til fjalla á Norðurlandi⁵⁷ og á Miðhálandinu.²⁶
127. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. – **Hjartarfi** – Algengur í byggð um allt land, einkum við gripahús, í matjurtarækt og annars staðar þar sem búfjáráburður er notaður.
128. *Subularia aquatica* L. – **Alurt** – Víða um land í tjörnum og vötnum, sjaldgæf á Vestfjörðum.
129. *Cakile maritima* Scop. subsp. *islandica* (Goud.) Hyl. ex Elven – **Fjörukál** – Algengt í fjörusandi einkum við vestanvert landið, strjállt um norðan- og austanvert landið.
- Sisymbrium altissimum* L. – *Risadesurt* – Slæðingur sem sést hefur allvíða um land allt síðan 1895.^{111, 134, 147} Sums staðar talinn innfluttur með hænsnafóðri.⁹⁸
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – *Götudesurt* – Slæðingur í Reykjavík 1959.^{108, 111}
- Descurainia incana* (Bernh. ex Fisch. & C.A.Mey.) Dorn – *Grápefjurt* – Slæðingur á Akureyri 1949,¹³⁴ ófundin annars staðar.
- Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl – *Peifjurt* – Slæðingur sem breiddist nokkuð út í Hörgárdal milli 1890–1900, og hefur sést öðru hvoru síðan bæði þar og víðar á Miðnorðurlandi⁷⁴ og á höfuðborgarsvæðinu.¹¹¹
- Isatis tinctoria* L. — Litunarklukka — Mj. sj. slæðingur, aðeins fundin í Reykjavík 1966.^{73,94}**
- Erysimum cheiranthoides* L. – *Akurgyllir* – Hefur fundist á nokkrum stöðum, einkum á Suðvesturlandi og í Eyjafirði á tímabilinu frá 1939–1970.^{18, 111, 134}
- Erysimum repandum* L. – *Hafnagyllir* – Mj. sj. slæðingur á Sauðárkróki um aldamótin 1900.¹³⁶
- Hesperis matronalis* L. – *Næturfjóra* – Slæðingur á örfáum stöðum, í Reykjavík og Vestmannaeyjum,¹¹¹ Kópavogi, Siglufirði¹³⁴ og á Norðfirði.
- Malcolmia maritima* (L.) R.Br. – *Martoppur* – Mj. sj. slæðingur í Vestmannaeyjum 1991.¹³⁴
- Barbarea vulgaris* W.T.Aiton – *Garðableikja* – Slæðingur með grasfræi allvíða um land frá tímabilinu 1910–1970,⁷⁴ og var á tímabili talin ílend,⁶⁸ en hefur lítið sést í seinni tíð. *Barbarea vulgaris* var. *arcuata* (Opiz ex J.Presl & C.Presl) Fr., *akurbleikja*, hefur verið skráð sem sjaldgæfur slæðingur á Siglufirði.¹¹¹
- Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek – *Brunnerperla* – Slæðingur á Sólheimum í Grímsnesi.¹¹¹
- Rorippa sylvestris* (L.) Besser – *Flækjurt* – Slæðingur sem fundist hefur allvíða, einkum á Suðvesturlandi og Eyjafjarðarsvæðinu.^{79, 111, 134, 147}
- Armoracia rusticana* P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. – *Piparrót* – Innflutt og ræktuð, slæðist stöku sinnum frá ræktun,¹¹¹ en hverfur fljótt aftur.
- Cardamine flexuosa* With. – *Kjarrklukka* – Óstaðfestar heimildir eru um þessa tegund frá Dyrhólum⁵⁰ og Seyðisfirði (1931).¹³⁴
- Berteroa incana* (L.) DC. – *Hvitduðra* – Sjaldgæfur slæðingur, óx á Sviðugörðum í Árnessýslu í nokkur ár, 1955–1960, talin innflutt með hænsnafóðri.¹⁰⁵
- Camelina microcarpa* Andrzej. ex DC. – *Hárdoðra* – Slæðingur sem sást hér og hvar á tímabilinu frá 1890 fram um 1950,⁷⁴ en engar heimildir eru um hárdóðruna síðar.

Camelina sativa (L.) Crantz – *Akurdoðra* – Slæðingur fundinn á þrem stöðum við Eyjafjörð á tímabilinu frá 1922–1956.^{111, 134} Ekki kunnugt um hann síðar.

Thlaspi arvense L – *Akursjóður* – Slæðingur við bæi allvíða um landið.^{111, 112, 134}

~~*Noceaea caeruleascens* (J. & C.Prest) F.K.Mey. — *Varpasjóður* — Mj. sj. slæðingur fundinn í Reykjavík, Borgarnesi og Húsavík.~~

Lepidium campestre (L.) R.Br. – *Akurperla* – Sjaldgæfur slæðingur fundinn á örfáum stöðum frá 1922–1966.¹¹¹

Lepidium densiflorum Schrad. – *Pyripierla* – Mj. sj., aðeins fundin á Gleráreyrum, Akureyri 1950 og 1951.^{111, 134, 147}

Lepidium heterophyllum Benth. – *Hnoðperla* – Sjaldgæfur slæðingur aðeins fundinn í Reykjavík, Borgarnesi, Siglufirði og Húsavík.

Lepidium latifolium L. – *Strandperla* – Mj. sj. slæðingur í grennd við Dalvík 1940.^{74, 111, 139}

Lepidium neglectum Thell. – *Kringluperla* – Mj. sj., aðeins fundin á Dalvík og í Reykjavík 1940– 1943.¹³⁴

Lepidium perfoliatum L. – *Slíðurperla* – Mj. sj., aðeins fundin á Sauðárkróki 1893.¹³⁴

Lepidium ruderales L. – *Haugperla* – Mj. sj., aðeins fundin á Kornsa í Vatnsdal fyrir 1900¹³⁶ og á Gleráreyrum á Akureyri 1950.^{134, 147}

Lepidium sativum L. – *Garðperla* – Mj. sj., aðeins fundin á þrem stöðum, Reykjavík, Siglufirði og Akureyri frá 1922–1966.¹³⁴

Lepidium virginicum L. – *Virginiuperla* – Mj. sj., aðeins fundin á einum stað, Naustanesi í Kollafirði 1946.¹³⁴

Conringia orientalis (L.) Dumort. – *Káljurt* – Einær slæðingur sem sást allvíða á fyrri hluta síðustu aldar, en lítið í seinni tíð.¹³⁴

Brassica napus L. – *Gulrófa*, *repja* – Ræktuð víða, annars vegar deilitegundin subsp. rapifera Metzg. (gulrófa) og hins vegar sem fóðurjurt, subsp. oleifera (DC.) Metzg. (repja). Einkum sú síðarnefnda sést oft sem slæðingur við fóðurakra.¹³⁴

Brassica oleracea L. – *Garðakál* – Mikið ræktað í mörgum tilbrigðum (blómkál, hvítkál, grænkál o.fl.). Blómstrar oft á síðara ári í og við garða, en helst trúlega ekki til lengdar.¹³⁴

Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) Clapham – *Arfanæpa* – Slæðingur allvíða bæði við garða og hænsnabú.¹¹² Önnur deilitegund, subsp. rapa, *næpa*, er nokkuð ræktað til manneldis, blómstrar stundum á síðari ári í yfirgefnum gördum, en helst varla lengi.

Sinapis alba L. – *Hvítur mustarður* – Slæðingur sem fundist hefur á nokkrum stöðum í sáðsléttum og við kartöflugarða.^{134, 145}

Sinapis arvensis L. – *Arfamustarður* – Allalgengur slæðingur víða um land allt frá 1890.^{111, 147}

Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz – *Hundakál* – Hefur tvisvar fundist í Reykjavík, 1966 og 1976, í síðara skiptið við Sundahöfn.¹³⁴

Raphanus raphanistrum L. – *Akurhreðka* – Allalgengur slæðingur sem fundist hefur hér og þar í garðlöndum og á grænófóðursökum.¹¹¹

Raphanus sativus L. – *Ætihreðka* – Víða ræktað sem fóðurjurt, slæðist þaðan en er að jafnaði ekki til langframa. ¹¹¹

Limnanthaceae Deigljurtarætt

Limnanthes douglasii R.Br. – *Eggjablóm* – Mj. sj. slæðingur, fannst á háskólalóðinni í Reykjavík 1953.^{97, 111, 134}

Droseraceae Sóldaggarætt

130. *Drosera rotundifolia* L. – *Sóldögg* – Hér og hvar í útsveitum á Vesturlandi og á Vestfjörðum, einnig í útsveitum beggja vegna Eyjafjarðar. Sjaldgæf á Austurlandi, ófundin annars staðar.

Crassulaceae Helluhnoðraætt

131. *Tillaea aquatica* L. – *Vatnsögn* – Mjög sjaldgæf, aðeins við jarðhita á þrem stöðum á Suðurlandi. ^{12, 137, 139}

132. *Rhodiola rosea* L. – *Burnirót* – Víða um allt land nema þar sem beit er að staðaldri.

133. *Sedum acre* L. – *Helluhnoðri* – Víða um land allt.

134. *Sedum annuum* L. – *Skriðuhnoðri* – Víða á láglandi um vestan- og sunnanvert landið og Austurland norður á Hérað. Fremur sjaldgæfur á Miðnorðurlandi, ófundinn í Húnavatnssýslum og á stórum svæðum á Norðausturlandi.

135. *Sedum villosum* L. – *Flagahnoðri* – Algengur um land allt.

Sedum album L. – *Ljósahnoðri* – Slæðingur frá ræktun í Varmahlíð í Skagafirði 1965.¹¹¹

Hylotelephium maximum (L.) Holub – *Völvuhnoðri* – Ræktaður í gördum og hefur einu sinni (1964) fundist sem slæðingur í skriðu ofan við Hlíðarvatn í Selvogi. ¹¹⁴

Parnassiaceae *Mýrasóleyjaætt*

136. *Parnassia palustris* L. – *Mýrasóley* – Algeng um land allt.

Saxifragaceae *Steinbrjótsætt*

137. *Saxifraga aizoides* L. – *Gullsteinbrjótur* – Algengur á Austurlandi frá Langanesströnd suður í Öræfi.³⁷ Ófundinn utan þess svæðis.

138. *Saxifraga cespitosa* L. – *Þúfusteinbrjótur* – Algengur um land allt.

139. *Saxifraga cernua* L. – *Laukasteinbrjótur* – Allvíða til fjalla í flestum landslutum, þó sjaldgæfari á Vestur- og Suðurlandi en annars staðar.

140. *Saxifraga cotyledon* L. – *Klettafrú* – Algeng eða víða á sunnanverðu Austurlandi frá Loðmundarfirði suður í Skaftártungu.³⁹ Ófundin annars staðar.

141. *Saxifraga foliolosa* R.Br. – *Hreistursteinbrjótur* – Sjaldgæfur, aðeins fundinn hátt til fjalla á Miðnorðurlandi frá Skagafirði austur í Kinnarfjöll.^{7, 57}

142. *Saxifraga granulata* L. – *Kornasteinbrjótur* – Mj. sj. slæðingur á höfuðborgarsvæðinu.^{5, 139}

143. *Saxifraga hirculus* L. – *Gullbrá* – Víða um land, einkum á hálendinu. Ófundin á vestur- og norðurhluta Vestfjarða, Reykjanesskaga og afar sjaldséð í útsveitum á Norðurlandi.

144. *Saxifraga hypnoides* L. – *Mosasteinbrjótur* – Algengur eða víða um land allt.

145. *Saxifraga nivalis* L. – *Snæasteinbrjótur* – Algengur, einkum til fjalla.

146. *Saxifraga oppositifolia* L. – *Vetrarblóm* – Algengt um land allt.

147. *Saxifraga paniculata* Miller – *Bergsteinbrjótur* – Sjaldgæfur, mest þó norðantil á Austfjörðum. Hefur einnig fundist á nokkrum stöðum á Vesturlandi, Vestfjörðum og vestanverðu Norðurlandi.

148. *Saxifraga rivularis* L. – *Lækjasteinbrjótur* – Víða um land, einkum til fjalla og á hálendinu, en sums staðar einnig í sjávarklettum.

149. *Saxifraga rosacea* Moench – *Toppasteinbrjótur* – Allalgengur, einkum á láglandi á landinu sunnanverðu. Útbreiðsla illa þekkt, þar sem hann hefur ekki alltaf verið aðgreindur frá þúfusteinbrjót.

150. *Saxifraga stellaris* L. – *Stjörnusteinbrjótur* – Algengur um land allt nema þurrasta hluta öræfanna.

151. *Saxifraga tenuis* (Wahlenb.) H.Smith ex Lindm. – *Dvergsteinbrjótur* – Fremur sjaldgæfur, þó allvíða hátt til fjalla.

Saxifraga umbrosa L. – *Skuggasteinbrjótur* – Mikið ræktaður til skrauts, sáir sér eitthvað út og finnst því einnig sem slæðingur utan garða á höfuðborgarsvæðinu. ^{17, 111, 129}

Grossulariaceae *Stikilsberjaætt*

152. *Ribes x pallidum* Otto & Dietr. – *Rífsberjarunni* – Mikið í ræktun, sáir sér víða í óræktaða jörð með aðstoð fugla og er sums staðar orðinn ílendur. ^{129, 134}

Ribes nigrum L. – *Sólberjarífs* – Ræktaður víða, vex á eigin spýtur sem slæðingur í Elliðaárdal. ¹²⁹

Ribes rubrum L. – *Rauðberjarífs* – Slæðingur í löngu yfirgefnum lóðum í Elliðaárdal¹²⁹ og Grafarvogi.¹³⁰

Ribes uva-crispa L. – *Stikilsberjarunni* – Vex sem slæðingur frá ræktun í Elliðaárdal.¹²⁹

Rosaceae *Rósætt*

153. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. – *Mjaðjurt* – Algeng um sunnan- og vestanvert landið frá Barðastrandasýslu austur í Hornafjörð og einnig við innanverðan Eyjafjörð. Annars fremur sjaldgæf, sums staðar slæðingur frá ræktun.

154. *Geum rivale* L. – *Fjaldalafífill* – Algengur um allt land nema á Suðausturlandi, virðist vanta þar á stórum svæðum.

155. *Dryas octopetala* L. – *Holtasóley* – Algeng um allt land.

156. *Sibbaldia procumbens* L. – *Fjallasmári* – Algengur til fjalla og þar sem snjóþungt er á láglandi.

157. *Potentilla crantzii* (Crantz) G.Beck ex Fritsch – *Gullmura* – Algengur um land allt.

158. *Potentilla erecta* (L.) Rauschel – *Blóðmura* – Mjög sjaldgæf, vex við jarðhita í Reykjarfirði nyrðri á Ströndum.⁴⁶ Vex aðeins á litlum bletti 1955 og óvíst um aldur hennar þar. Annars staðar hefur hún aðeins sést sem slæðingur á örfáum stöðum.
159. *Argentina anserina* (L.) Rydb. – *Tágamura* – Algeng einkum með ströndum fram, sjaldgæf á miðhálandinu.
160. *Argentina egedii* (Wormskj.) Rydb. – *Skeljamura* – Víða með sjó fram á norðanverðu landinu, vex eingöngu á sjávarfitjum.
161. *Comarum palustre* L. – *Engjarós* – Algeng.
162. *Fragaria vesca* L. – *Jarðarber* – Hitakær jurtt sem er algeng um sunnan- og vestanvert landið, einnig víða í innsveitum frá Skagafirði austur í Suður-Þingeyjarsýslu og á Fljótsdalshéraði.
163. *Rubus saxatilis* L. – *Hrútaber* – Algeng um land allt, nema vantar sums staðar í Vestur-Húnavatnssýslu.
164. *Rosa dumalis* Bechst. – *Glitrós* – Mj. sj., aðeins fundin á Kvískerjum í Örafum, fyrst getið árið 1756.¹³⁹
165. *Rosa pimpinellifolia* L. – *Þyrnirós* – Sjaldgæf, vex villt á 6 stöðum á landinu í dag,^{67, 91, 137} en útdauð á sjöunda staðnum.⁶⁵
166. *Alchemilla alpina* L. – *Ljónslappi* – Algengur um land allt.
167. *Alchemilla faeroensis* (Lange) Buser – *Mariuvöttur* – Algengur á Austurlandi frá Langanesi suður í Örfæfi. Sjaldgæfur á austanverðu Norðurlandi,¹³⁹ ófundinn annars staðar.
168. *Alchemilla filicaulis* Buser – *Mariustakkur* – Algengur um land allt. Skiptist í tvær deilitegundir sem báðar eru algengar, subsp. *filicaulis* og subsp. *vestita* (Buser) M.E. Bradshaw, *hlíðamariustakkur*, sem áður var stundum talin sjálfstæð tegund.
169. *Alchemilla glabra* Neygenf. – *Brekkumariustakkur* – Vex á nokkrum stöðum í mismunandi landslutum, stundum í þéttum breiðum. Betri upplýsingar vantar um útbreiðslu.¹³⁹
170. *Alchemilla glomerulans* Buser – *Hnoðamariustakkur* – Algengur um land allt, oft allhátt til fjalla.
171. *Alchemilla mollis* (Buser) Rothm. – *Garðamariustakkur* – Innfluttur og ræktaður í görðum, en hefur slæðst út fyrir þá á nokkrum stöðum^{126, 129, 134} og virðist sums staðar vera orðinn ílendur.
172. *Alchemilla subcrenata* Buser – *Engjamariustakkur* – Sjaldgæfur, hefur fundist á nokkrum stöðum einkum við byggð.^{111, 146}
173. *Alchemilla wicheriae* (Buser) Stefánsson – *Silfumariustakkur* – Allvíða um landið, vex einkum í giljum og á skjólsælum stöðum.
174. *Sanguisorba alpina* Bunge – *Höskollur* – Slæðingur frá ræktun, sums staðar ílendur.¹²³
175. *Sanguisorba officinalis* L. – *Blóðkollur* – Sjaldgæfur, fundinn á nokkru svæði á Suðvesturlandi frá Borgarfirði að Ölfusá, einnig á Snæfellsnesi. Nokkuð hefur blóðkollurinn einnig verið fluttur milli landshluta til ræktunar.⁴⁵
176. *Sorbus aucuparia* L. – *Reynir* – Víða um land, einkum í birkikjarri á Vestfjörðum, í útsveitum Miðnorðurlands og á Austfjörðum. Víða ræktaður og dreifist þaðan með fuglum.
- Spiraea x billardii* Héring – *Úlfakvistur* – Slæðingur frá ræktun í gömlum lóðum og með úrgangi úr görðum.
- Spiraea salicifolia* L. – *Víðkivistur* – Ræktaður víða, slæðingur í Elliðaárdal.¹²⁹
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – *Reyniblaðka* – Ræktuð til skrauts, skráð sem slæðingur á einum stað.¹²⁹
- Filipendula kamtschatica* (Pallas) Maxim. – *Risamjadjurt* – Ræktuð í görðum, slæðingur í Elliðaárdal í Reykjavík.¹²⁹
- Geum x heldreichii hort. ex Bergmans – *Skrúðdalafífill* – Ræktaður í görðum og er farinn að dreifa sér í Elliðaárdal í Reykjavík.¹²⁹
- Geum x sudeticum Tausch – *Blikdalafífill* – Ræktaður í görðum en farinn að dreifast og vaxa utan garðs í Elliðaárdal í Reykjavík.¹²⁹
- Geum macrophyllum Willd. – *Skógdalafífill* – Skráður sem slæðingur við malbikunarstöðina á Akureyri og í Elliðaárdal í Reykjavík.^{129, 134}
- Potentilla fruticosa* L. – *Runnamura* – Víða í ræktun í görðum, slæðist eitthvað þaðan.¹²⁹
- Potentilla norvegica* L. – *Noregsmura* – Hefur fundist á nokkrum stöðum sem slæðingur.^{70, 111, 134, 139}
- Rubus idaeus* L. – *Hindber* – Ræktuð allvíða, hafa slæðst frá ræktun á nokkrum stöðum og ílenst.^{111, 114, 129}
- Rubus spectabilis* Pursh – *Laxaber* – Slæðingur sem vex í töluverðum breiðum við Grafarvog¹³⁰ og hefur einnig fundist sjálfsáinn inni í lúpinubreiðu.
- Rosa rugosa* Thunb. ex Murray – *Ígulrós* – Slæðingur í yfirgefnum lóðum í Elliðaárdal og Grafarvogi.^{129, 130}
- Sanguisorba canadensis* L. – *Kanadakollur* – Ræktaður, og sáir sér nokkuð út á höfuðborgarsvæðin

Malus x domestica Borkh. – *Eplatré* – Finnst oft sem litlar fræplöntur einkum í nágrenni skóla eða við sorphauga, en helst aldrei til langframa.^{97, 108, 111, 134}

Sorbus mougeotii Soy-Willem. & Godr. – *Alpareynir* – Sáir sér lítið eitt út frá ræktun, m.a. í Elliðaárdal. ¹²⁹

Prunus padus L. – *Heggur* – Ræktaður í görðum, sáði sér á tímabili nokkuð út í Gróðrarstöðinni á Akureyri og síðar í Kjarnaskógi.¹¹⁵

Fabaceae Belgjurtaætt

177. Lupinus nootkatensis Donn ex Sims – *Alaskalúpína* – Ræktuð hér frá því snemma á 20. öld, innflutt til uppgræðslu frá Alaska 1945,³² dreifir sér sjálfkrafa og er löngu ílend.

178. Trifolium hybridum L. – *Túnsmári* – Innfluttur í fræblöndum til uppgræðslu og túnræktar. Sáir sér út og dreifist af sjálfsdáðum, löngu orðinn ílendur víða um land.^{30, 111, 112, 134}

179. Trifolium medium L. – *Skógarsmári* – Slæðingur sem orðinn er ílendur í Reykjavík og Hveragerði.¹³⁴

180. Trifolium pratense L. – *Rauðsmári* – Innflutt tegund sem er löngu orðin ílend á mörgum stöðum,^{70, 74, 111, 134} einkum norðanlands.

181. Trifolium repens L. – *Hvítsmári* – Útbreiddur um land allt, a.m.k. á láglandi nema fremur fátíður í sumum sveitum Vestfjarða og Norðausturlands.

182. Anthyllis vulneraria L. subsp. *borealis* (Rouy) Jalas – *Gullkollur* – Algengur á tveim svæðum landsins, á Reykjanesskaga og nyrst á Austfjörðum, einkum við Loðmundarfjörð.

183. Vicia cracca L. – *Umfeðmingur* – Víða um land á láglandi, algengastur á Suðvesturlandi, Norðurlandi og Austurlandi.

184. Vicia sepium L. – *Giljaflækja* – Allvíða syðst á landinu, Vestmannaeyjum, undir Eyjafjöllum og í Mýrdal.⁸² Annars staðar á nokkrum stöðum sem slæðingur.^{29, 137}

185. Lathyrus japonicus Willd. subsp. *maritimus* (L.) P.W.Ball – *Baunagrás* – Víða meðfram ströndum landsins í sandi, en einnig á nokkrum stöðum lengra inni í landi, einkum á Suðurlandi.

186. Lathyrus palustris L. – *Mýraertur* – Fremur sjaldgæfar en dreifðar kringum landið.^{44, 46, 72} Ófundnar á Suðausturlandi frá Mýrdal að Fáskrúðsfirði.

187. Lathyrus pratensis L. – *Fuglaertur* – Á allmörgum stöðum á Suðvesturlandi frá Höfuðborgar-svæðinu austur í Mýrdal. Sjaldgæfar í öðrum landshlutum.

Lupinus arcticus S.Wats. – *Skollalúpína* – Aðfluttur slæðingur á Keldnaholti í Reykjavík og á Geitasandi á Rangárvöllum.

Lupinus polyphyllus Lindl. – *Garðalúpína* – Ræktuð í görðum en hefur á nokkrum stöðum slæðst frá ræktun. ^{129, 134}

Medicago lupulina L. – *Úlasmári* – Sjaldgæfur slæðingur í Reykjavík og nágrenni 1876–1965.^{134, 138}

Medicago sativa L. – *Refasmári* – Mj. sj. slæðingur á örfáum stöðum 1933–1961.^{74, 134, 138}

Melilotus albus Medik. – *Mjallarsteinsmári* – Sjaldgæfur slæðingur á nokkrum stöðum.^{96, 134}

Melilotus officinalis (L.) Lam. – *Mánasteinsmári* – Sjaldgæfur slæðingur sem sést hefur hér og hvar um landið frá 1889 til 1977.^{74, 96, 111, 134}

Trifolium aureum Pollich – *Gullsmári* – Mj. sj. slæðingur á Akureyri 1923.¹³⁴

~~Trifolium dubium Sibth. – Músasmári – Mj. sj. slæðingur í Reykjavík 1950–1960.^{79, 111, 134}~~

Lotus corniculatus L. – *Akurmáriuskór* – Aðfluttur slæðingur á nokkrum stöðum, einkum á Suðvesturlandi. ^{111, 134}

Astragalus alpinus L. – *Seljahnúta* – Innflutt og ræktuð til landgræðslu. Sáir sér töluvert út, m.a. á Fljótisdalshéraði. ¹³⁴

Vicia angustifolia L. – *Sumarflækja* – Mj. sj. slæðingur við Siglunesvita 1957.¹³⁴

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray – *Loðflækja* – Sjaldgæf, hefur sést sem slæðingur í Reykjavík, á Sauðárkróki og Akureyri 1895–1934.^{74, 134}

Vicia sativa L. – *Akurlflækja* – Hefur verið ræktuð sem fóðurjurt, og fundist sem slæðingur á nokkrum stöðum á landinu.¹³⁴

Vicia villosa Roth – *Dúnflækja* – Mj. sj. slæðingur á Klængshóli í Svarfaðardal 1914.⁷⁴

Pisum arvense L. – *Gráertur* – Sjaldgæfur slæðingur sem hefur fundist á nokkrum stöðum.^{74, 111, 134}

Pisum sativum L. – *Garðertur* – Ræktuð sem fóðurjurt og finnst stundum sem slæðingur frá ræktun við vegi og bæi.^{111, 134, 139}

Oxalidaceae Súrsmaeruætt

188. Oxalis acetosella L. – *Súrsmaera* – Mjög sjaldgæf, aðeins á örfáum stöðum á Austfjörðum frá Héraðsflóa suður í Seyðisfjörð.^{38, 107, 137}

Oxalis corniculata L. – *Hornsmæra* – Mj. sj. slæðingur við jarðhita í Hveragerði og í Reykholtssdal.¹³⁴

~~*Oxalis stricta* L. – *Akursmæra* – Mj. sj. slæðingur við jarðhita, aðeins fundinn í Hveragerði og í Reykholtssdal.^{105, 111, 112, 134}~~

Geraniaceae *Blágresisætt*

189. *Geranium sylvaticum* L. – *Blágresi* – Algengt um land allt.

Geranium x magnificum Hyl. – *Kóngablágresi* – Í ræktun sem garðjurt, slæðingur í Elliðaárdal.¹²⁹

Geranium molle L. – *Loðblágresi* – Mj. sj. slæðingur í Glerárhverfi, Akureyri 1939.^{74, 134}

Geranium pratense L. – *Garðablágresi* – Ræktað í görðum, hefur slæðst frá ræktun á höfuðborgarsvæðinu og víðar.^{74, 129}

Geranium pusillum L. – *Dvergblágresi* – Sjaldgæfur slæðingur í Reykjavík og á Akureyri.¹³⁴

Geranium robertianum L. – *Rauðgresi* – Slæðingur við Fiskverksmiðjuna Dverg í Reykjavík árið 1950.^{95, 111}

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. – *Hegranef* – Aðeins fundið á þrem stöðum á Suðvesturlandi.^{116, 134, 137}

Linaceae *Línætt*

190. *Linum catharticum* L. – *Villilín* – Algengt um neðri hluta Suðurlands, á Skarðsströnd, við Eyjafjörð, á Fljótsdalshéraði og hluta af Austfjörðum. Ófunduð utan þessara svæða.

Linum usitatissimum L. – *Spunalín* – Sjaldgæfur slæðingur á fáeinum stöðum frá 1895–2000.^{111, 134, 146}

Euphorbiaceae *Mjólkurjurtaætt*

Euphorbia cyparissias L. – *Sedrusmjólk* – Aðeins fundin einu sinni á Akureyri sem slæðingur úr garði.¹³⁴

Malvaceae *Stokkrósætt*

Malva pusilla Sm. – *Hænsnarós* – Slæðingur í Reykjavík um 1950.^{79, 111, 134}

Malva verticillata L. var. *crispa* L. – *Kransmalva* – Líklega ræktað eitthvað sem salat, skráð sem slæðingur á Gamla Hrauni við Eyrarbakka 1950.^{108, 147}

Clusiaceae *Gullrunnaætt*

Hypericum maculatum Crantz – *Flekkjagullrunni* – Mj. sj. slæðingur, aðeins fundinn á tveim stöðum á Austfjörðum, Neskaupstað 1977 og við Reyðarfjörð 2003.¹³⁴

Hypericum perforatum L. – *Doppugullrunni* – Mj. sj. slæðingur, aðeins á einum stað í skógrækt nálægt Selfossi 2009.

Violaceae *Fjólúætt*

191. *Viola canina* L. – *Týsfjola* – Algeng á láglandi kringum landið, nema sjaldgæf á Suðausturlandi frá Mýrdalssandi að Hornafirði. Tvær deilitegundir eru hér á landi, subsp. *canina* sem er algengust og subsp. *nemoralis* (Kütz), *urðafjola*, sem hefur uppréttan stöngul og hefur fundist allvíða.

192. *Viola epipsila* Ledeb. – *Birkifjola* – Víða á landræna svæðinu á austanverðu Norðurlandi^{66, 67} og á Héraði. Ófundin utan þess.

193. *Viola palustris* L. – *Mýrfjola* – Algeng í votlendi um land allt.

194. *Viola riviniana* Reichenb. – *Skógfjola* – Fremur sjaldgæf, nokkuð útbreidd á fáum svæðum, sunnanverðum Reykjanesskaga, miðju Snæfellsnesi,¹⁴⁹ utan til á Flateyjarskaga við Eyjafjörð⁶⁶ og norðan Reyðarfjarðar á Austfjörðum.⁶⁷ Mjög sjaldséð utan þessara svæða.

195. *Viola tricolor* L. – *Prenningarfjola* – Allvíða sums staðar á Vesturlandi og Norðurlandi, einnig á Fljótsdalshéraði og sumum fjörðunum fyrir austan. Sjaldgæf í öðrum landshlutum.

Viola arvensis Murray – *Arfafjola* – Mj. sj. slæðingur á örfáum stöðum, síðast fundin 2008 í grassáningum við skógarstíga norðan Fossár í Hvalfirði.

Onagraceae *Eyrarrósarætt*

196. *Epilobium alsinifolium* Vill. – *Lindadúnurt* – Algeng um allt land.

197. *Epilobium anagallidifolium* Lam. – *Fjalladúnurt* – Algeng til fjalla um allt land, sjaldgæf eða vantar á láglandi, einkum sunnanlands.

198. *Epilobium ciliatum* Raf. – *Vætudúnurt* – Barst til landsins um 1955¹¹¹ og hefur síðan breiðst mikið út um Suðvesturland og um Eyjafjörðinn og er orðin ílend á þeim stöðum. Fremur sjaldgæf annars staðar enn sem komið er. Tvær deilitegundir finnast hér af þessari tegund samkvæmt Snogerup sem hefur skoðað það sem til er í söfnum, subsp. *ciliatum* og subsp. *glandulosum* (Lehm.) Hoch & P.H. Raven, *kirtildúnurt*.¹³⁴
199. *Epilobium collinum* C.C.Gmelin – *Klappadúnurt* – Hitakær jurtt sem er algeng á Suðurog Vesturlandi frá syðri hluta Vestfjarða allt norður til Seyðisfjarðar á Austurlandi. Sjaldgæf á norðanverðu landinu og vex þar sums staðar aðeins við jarðhita.
200. *Epilobium hornemannii* Reichenb. – *Heiðadúnurt* – Algeng um allt land, einkum til fjalla, vantar eða er sjaldgæf á láglandi sunnanlands
201. *Epilobium lactiflorum* Hausskn. – *Ljósadúnurt* – Allalgeng en fremur strjál um allt land, sjaldséð á láglandi sunnanlands.
202. *Epilobium palustre* L. – *Mýradúnurt* – Algeng um allt land nema hátt til fjalla.
203. *Chamerion angustifolium* (L.) Holub. – *Sigurskúfur* – Sjaldgæfur, en dreifður um landið, algengastur á Miðnorðurlandi og Fljótsdalshéraði. Finnst bæði sem slæðingur í þéttbýli og villtur í hlíðarbrekkum og klettum.
204. *Chamerion latifolium* (L.) Holub. – *Eyrarrós* – Víða um land, einkum á hálendinu og meðfram ám.
- Epilobium montanum* L. – *Runnadúnurt* – Sjaldgæfur slæðingur, hefur aðeins fundist í Mið- og Vesturbæ Reykjavíkur.¹¹¹

Haloragaceae *Maraætt*

205. *Myriophyllum alterniflorum* DC. – *Síkjamari* – Allalgeng jurtt í síkjum og tjörnum víða um land.
206. *Myriophyllum sibiricum* Kom. – *Vatnamari* – Vatnajurt sem finnst allvíða á Norðurlandi frá Skagafirði austur í Óxarfjörð, sjaldgæf utan þess svæðis.

Cornaceae *Skollabersætt*

207. *Cornus suecica* L. – *Skollaber* – Fremur sjaldgæf, vaxa á smáblettum, einkum á Vestfjörðum, útskögum við Skagafjörð og Eyjafjörð, og á norðanverðu Snæfellsnesi. Annars aðeins þekkt frá þrem stöðum norðan til á Austfjörðum.

Araliaceae *Bergfléttuætt*

208. *Hydrocotyle vulgaris* L. – *Vatnsnafli* – Víða við jarðhita í uppsveitum Borgarfjarðar og Árnessýslu, ófundinn annars staðar.

Apiaceae *Sveipjurtaætt*

209. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – *Skógarkerfill* – Fyrst skráður á Akureyri 1923⁶⁸ sem erlendur slæðingur en hefur síðan ílenst víða og breiðist ört út.¹⁰³
210. *Myrrhis odorata* (L.) Scop. – *Spánarkerfill* – Ræktaður víða í görðum og hefur slæðst þaðan og er löngu ílendur.
211. *Carum carvi* L. – *Kúmen* – Algengt á Suðurog Suðvesturlandi, annars allvíða í byggðum landsins.
212. *Aegopodium podagraria* L. – *Geitakál* – Talið upphaflega innflutt af norskum hvalveiðimönnum að Asknesi við Mjóafjörð.¹¹¹ Var tekið í garða þaðan víðs vegar um Austfirði og er löngu orðið ílent.⁹⁹ Á nokkrum öðrum stöðum í nágrenni þéttbýlis.¹⁰³
213. *Ligusticum scoticum* L. – *Sæhvönn* – Allvíða í strandklettum á vestanverðu landinu, mjög sjaldgæf annars staðar.
214. *Angelica archangelica* L. – *Ætihvönn* – Algeng um allt land.
215. *Angelica sylvestris* L. – *Geithvönn* – Algeng víða um land nema á hálendinu.
- Aethusa cynapium* L. – *Villisteinselja* – Sjaldgæfur slæðingur 1966, Reykjavík.¹³⁴
- Levisticum officinale* Koch – *Skessujurt* – Ræktuð í görðum, vex sem slæðingur í Elliðaárdal.¹²⁹
- Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier – *Bjarnarkló* – Vinsæl jurtt til ræktunar í görðum, en er farin að dreifa sér af sjálfsdáðum á nokkrum stöðum.¹³⁴
- Heracleum sphondylium* L. – *Húnakló* – Hefur slæðst frá ræktun í Reykjavík, einkum í Skjólunum og við Gullinbrú.¹²⁶
- Torilis japonica* (Houtt.) DC. – *Runnakerfill* – Mj. sj. slæðingur í Reykjavík um 1950.^{92, 111}

Daucus carota L. subsp. *sativus* (Hoffm.) Arcang. – *Gulrót* – Tvíær matjurt sem blómstrar seinna árið. Finnst stundum blómstrandi í garðstæðum árið eftir, en ílendist ekki.¹³⁴

Pyrolaceae *Vetrarliljuætt*

216. *Pyrola grandiflora* Radius – *Bjöllulilja* – Allvíða á austanverðu Norðurlandi frá Eyjafirði austur á utanvert Fljótsdalshérað. Sjaldgæf sunnar á Austfjörðum, ófundin annars staðar.
217. *Pyrola minor* L. – *Klukkublóm* – Algengt um land allt, nema síst á láglendi Suðurlands.
218. *Orthilia secunda* (L.) House – *Grænliilja* – Allvíða í skóglendi við sunnanvert Djúpið og í Barðastrandasýslu á Vestfjörðum, einnig við utanverðan Eyjafjörð og Þingeyjarsýslum austur í Öxarfjörð. Sjaldgæfari annars staðar, en finnst þó dreift um landið.

Ericaceae *Lyngætt*

219. *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv. – *Sauðamergur* – Algengur um allt land nema sjaldgæfur á láglendi Suðurlands frá Ölfusá að Skeiðará.
220. *Phyllodoce caerulea* (L.) Bab. – *Bláklukkulyng* – Allvíða á útskögnum beggja megin Eyjafjarðar, einnig fundið á Tjörnesi og við Loðmundarfjörð og Borgarfjörð fyrir austan. Ófunduð annars staðar.
221. *Harrimanella hypnoides* (L.) Coville – *Mosalýng* – Algengt um mestallt land, vantar sums staðar á láglendi.
222. *Andromeda polifolia* L. – *Ljósalyng* – Sjaldgæft, í súrurum mýrum, aðeins fundið í Brúnavík, ⁵⁵ Borgarfirði eystra og Úthéraði.³⁵
223. *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Sprengel – *Sortulyng* – Algengt víða um landið, en sums staðar stórar eyður í útbreiðslunni, t.d. á norðanverðum Vestfjörðum, Strandasýslu og Vestur-Húnavatnssýslu.
224. *Calluna vulgaris* (L.) Hull – *Beitilyng* – Algengt um stóran hluta landsins, vantar á Vestfjörðum og Vestur-Húnavatnssýslu, einnig ófunduð inn til landsins í Austur-Húnavatnssýslu og Skagafirði.
225. *Vaccinium myrtillus* L. – *Aðalbláberjalyng* – Algengt á Vesturlandi, Norðurlandi og Austurlandi frá Ölfusá/Hvítá norður um og suður í Suðursveit. Sjaldgæft á hálendinu og á Suðurlandi, vantar að jafnaði þar sem snjólétt er á láglendi.⁶²
226. *Vaccinium uliginosum* L. – *Bláberjalyng* – Algengt um land allt. Tvær deilitegundir bláberja munu vera til á Íslandi, subsp. *uliginosum* er algeng um land allt, en subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm., *smáblaðalyng*, er einnig til hér en óvíst um útbreiðslu.
227. *Vaccinium vitis-idaea* L. – *Rauðberjalyng* – Sjaldgæft, mest á Austurlandi frá Berufirði⁹⁶ norður á suðurströnd Reyðarfjarðar. ^{41, 67} Utan þess svæðis aðeins á nokkru svæði í Núpasveit við Öxarfjörð,⁷² og smáblettir í Þrastaskógi og við Rauðavatn.¹³⁴
228. *Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr. – *Mýraberjalyng* – Allvíða á svæðinu frá Skagafirði austur í Mývatnssveit, og einnig á Fljótsdalshéraði og nyrst á Austfjörðum. Annars staðar sjaldgæft.
- Erica tetralix* L. – *Hautlyng* – Mjög sjaldgæft. Nýlega fundið á tveim stöðum, óvíst hvenær eða hvernig tegundin hefur borist til landsins, eða hvort hún muni ílendast.³

Empetraceae *Krækilyngsætt*

229. *Empetrum nigrum* L. – *Krækilyng* – Algengt um land allt. Krækilyngi er oft skipt í tvær deilitegundir, subsp. *nigrum* og subsp. *hermaphroditum* (Lange ex Hagerup) Bøcher. Sú síðarnefnda er miklum algengari hér, bæði á láglendi en einnig allhátt til fjalla. Hún hefur stærri ber og tvíkynja blóm. Subsp. *nigrum* sem yfirleitt hefur einkynja blóm hefur fundist allvíða á láglendi en vex ekki til fjalla.¹⁴⁶

Diapensiaceae *Fjallabrúðuætt*

230. *Diapensia lapponica* L. – *Fjallabrúða* – Fjallajurt sem fundin er á allmörgum stöðum á Norðurlandi frá Skaga austur á Digranes, einkum í útsveitum. Nær lengra inn í landið meðfram Austurdal í Skagafirði, einn fundarstaður á Vestfjörðum.¹³⁴

Primulaceae *Mariulykilsætt*

231. *Primula egaliksensis* Wormsk. – *Davíðslykill* – Mjög sjaldgæfur, aðeins fundinn á einum stað á Árskógsströnd þar sem hann óx allmarga áratugi á síðustu öld,^{83, 104} en er nú útdauður á þessum stað.
232. *Primula stricta* Hornem. – *Mariulykill* – Sjaldgæfur, aðeins fundinn á nokkru svæði frá Hjalteyri og inn fyrir botn Eyjafjarðar.⁶¹
233. *Trientalis europaea* L. – *Sjóstjarna* – Algeng á Austurlandi frá Vopnafirði suður í Örfæfi. Annars staðar aðeins fundin á einum stað í Öxarfirði og þrem á Suðurlandi.^{134, 139}
234. *Glaux maritima* L. – *Sandlæðingur* – Sjaldgæfur, fundinn á nokkrum stöðum á sjávarflæðum á Vesturlandi frá Barðaströnd suður í Herdísarvík.
- Lysimachia punctata* L. – *Útlagi* – Ræktaður sem skrautjurt, einnig fundinn sem slæðingur í Reykjavík. ^{129, 134}
- Anagallis arvensis* L. – *Nónblóm* – Slæðingur í Reykjavík um 1960,¹¹¹ óvíst um það síðar.

Gentianaceae *Mariuvandarætt*

235. *Gentiana nivalis* L. – *Dýragras* – Algengt um land allt.
236. *Gentianopsis detonsa* (Rottb.) Ma – *Engjavöndur* – Víða um land, einkum nálægt sjó, frá Herdísarvík norður og austur um til Hornafjarðar. Ófundinn á Suðurlandi.
237. *Comastoma tenellum* (Rottb.) Toyok. – *Mariuvendingur* – Víða, einkum inn til landsins og á hálendinu.
238. *Gentianella amarella* (L.) Börner subsp. *septentrionalis* (Druce) N.M.Pritchard – *Grænvöndur* – Víða um allt land, algengastur við Eyjafjörð og á Fljótsdalshéraði.
239. *Gentianella aurea* (L.) H.Smith – *Gullvöndur* – Algengur um allt land.
240. *Gentianella campestris* (L.) Börner subsp. *islandica* (Murb.) Á.Löve & D.Löve – *Mariuvöndur* – Algengur á láglandi.
241. *Lomatogonium rotatum* (L.) Fries ex Fern. – *Blástjarna* – Víða um land, algengust í innsveitum á Norðausturlandi.

Menyanthaceae *Horblöðkuætt*

242. *Menyanthes trifoliata* L. – *Horblaðka* – Algeng í votlendi um allt land.

Convolvulaceae *Vafklukkuætt*

- Calystegia sepium* (L.) R.Br. – *Mariuvafklukka* – Hefur fundist einu sinni sem slæðingur við Álafoss árið 1971.¹³⁴
- Convolvulus arvensis* L. – *Akurvafklukka* – Slæðingur sem hefur sést í Reykjavík og á Siglufirði 1934–1963.^{111, 134}
- Cuscuta campestris* Yunck – *Vafsníkja* – Sjaldgæfur slæðingur í gróðurhúsi á Varmalandi í Mosfellssveit 1954 á stönglum *Chrysanthemum-jurta*.¹⁰⁸

Polemoniaceae *Jakobsstigaætt*

- Polemonium caeruleum* L. – *Jakobsstigi* – Ræktaður til skrauts, hefur sést sem slæðingur á fáeinum stöðum. ^{129, 134}

Solanaceae *Náttskuggaætt*

- Solanum nigrum* L. – *Húmskuggi* – Slæðingur á örfáum stöðum á Suðvesturlandi.¹¹¹

Rubiaceae *Möðruætt*

243. *Galium boreale* L. – *Krossmaðra* – Algeng á öllu Suðvesturlandi frá Dölum að Markarfljóti. Víða á Fljótsdalshéraði og fundin á smáblettum á nokkrum stöðum á Norðurlandi.
244. *Galium normanii* O.C.Dahl – *Hvítmaðra* – Algeng um land allt.
245. *Galium palustre* L. – *Mýramaðra* – Mjög sjaldgæf, aðeins fundin á tveim stöðum í Flóanum. Fannst fyrst árið 1943 en sá fundarstaður er óþekktur.¹³⁴ Fannst aftur 1970²⁷ og er þar enn 2004.⁶⁵
246. *Galium trifidum* L. – *Prenningarmaðra* – Fundin á allmörgum stöðum dreift um landið nema á Suðausturlandi og Austfjörðum frá Mýrdal að Fljótsdalshéraði.
247. *Galium uliginosum* L. – *Laugamaðra* – Fundin á allmörgum stöðum dreift um landið nema á Suðausturlandi, sums staðar nokkuð algeng eins og t.d. í nágrenni Akureyrar.
248. *Galium verum* L. – *Gulmaðra* – Algeng um land allt nema sums staðar á hálendinu.

Galium aparine L. – *Krókamaðra* – Slæðingur sem hefur borist til landsins öðru hverju a.m.k. frá 1889–1968,^{70, 111, 139} en hefur ekki ílenst.

Galium mollugo L. **subsp. erectum** – *Ljósamaðra* – Slæðingur sem hefur fundist víða á höfuðborgarsvæðinu.¹⁰⁵ og við Eyjafjörð,^{146, 147} sjaldgæfur annars staðar.¹¹¹

Galium odoratum (L.) Scop. – *Ilmaðra* – Aðeins skráð á einum stað á landinu, Hróarsdal í Skagafirði árið 1966.¹¹¹

Sherardia arvensis L. – *Blámaðra* – Mj. sj. slæðingur í Reykjavík og Sólheimum í Grímsnesi 1953.^{17, 111}

Asperula **orientalis** L. – *Akursystir* – Aðeins skráð sem slæðingur í Reykjavík 1926,¹³⁴ engar heimildir um hana annars staðar.

Callitrichaceae *Vatnsbrúðuætt*

249. *Callitriche brutia* Petagna – *Lækjabrúða* – Sjaldgæf votlendisjurt sem vex á nokkrum stöðum, einkum á Suðvesturlandi.

250. *Callitriche hamulata* Kütz. ex Koch – *Sikjabrúða* – Vatnajurt, algeng um allt land á láglandi.

251. *Callitriche hermaphroditica* L. – *Haustbrúða* – Sjaldgæf vatnajurt sem vex á kafi í vatni, fundin á fáum stöðum, dreifðum um landið, nema nokkuð algeng í vatnakerfi Mývatns og Laxár í Suðurlandshlí.⁶⁹

252. *Callitriche palustris* L. – *Vorbrúða* – Nokkuð algeng vatnajurt á láglandi.

253. *Callitriche stagnalis* Scop. – *Laugabrúða* – Allvíða í síkjum og við laugar á Suðvesturlandi. Annars staðar mjög sjaldgæf og líklega eingöngu við jarðhita utan Suðvesturlands.

Hippuridaceae *Lófótætt*

254. *Hippuris tetraphylla* L. fil. – *Flæðalófótur* – Sjaldgæfur, fundinn á nokkrum stöðum á norðanverðu landinu í síkjum og leirum, **eingöngu** á sjávarflæðum. ¹⁴⁹

255. *Hippuris lanceolata* Retx. – *Lensulófótur* – Allvíða, bæði á sjávarflæðum og lengra inni í landi.

256. *Hippuris vulgaris* L. – *Lófótur* – Algengur um land allt.

Boraginaceae *Munablómsætt*

257. *Myosotis arvensis* (L.) Hill – *Gleym-mér-ei* – Algeng í byggðum landsins nema á Norðausturlandi frá Öxarfirði til Vopnafjarðar, þar ófundin.

258. *Myosotis discolor* Pers. – *Kisugras* – Finnst einkum á tveim svæðum, austan Rangár að Eyjafjöllum, og í nágrenni höfuðborgarinnar. Annars mjög sjaldgæf.

259. *Myosotis scorpioides* L. – *Engjamunablóm* – Víða ræktað til skrauts, en sáir sér út og dreifist auðveldlega meðfram lækjum og ám.¹⁰⁶ Orðið ílent á mörgum stöðum víða um land.

260. *Myosotis stricta* Link ex Roemer & Schultes – *Sandmunablóm* – Allvíða á Vestfjörðum og vestanverðu Norðurlandi austur fyrir Eyjafjörð. Annars mjög sjaldgæft.

261. *Mertensia maritima* (L.) S.F.Gray – *Blálilja* – Algeng í fjörusandi kringum landið.

Cynoglossum officinale L. – *Hundatunga* – Slæðingur á Akureyri 1945.⁷⁴

***Lappula marginata* (M. Bieb.) Gürke – Slæðingur á Lyngholti, Saurbæjarási í Fljótum 1956.**

Lappula myosotis Moench – *Íguljurt* – Fundin á nokkrum stöðum um landið á tímabilinu frá 1888 til 1951.^{136, 139} Hefur ekki sést hin síðari ár.

Asperugo procumbens L. – *Klóajurt* – Var skráð sem slæðingur á Þingeyrum í Húnaþingi árið 1929,¹³⁴ ekki kunnugt um hana annars staðar. **Sumarið 2008 var klóajurtin enn til staðar á Þingeyrum og virðist því vera ílend þar.**

Symphytum asperum Lepechin – *Burstavalurt* – Slæðingur á Laugarvatni 1945¹³⁴ og í Elliðaárdal.¹²⁹

Symphytum officinale L. – *Valurt* – Mj. sj. slæðingur. ¹¹¹

Borago officinalis L. – *Hjólkróna* – Mjög sjaldgæfur slæðingur, aðeins fundin í Reykjavík 1954.¹³⁴ *Anchusa arvensis* (L.) M.Bieb. – *Uxajurt* – Slæðingur á Reykjalandi^{17, 111} og á Siglufirði um 1940– 1960, líklega innflutt með hænsnafóðri, óvíst um hana síðar.

Myosotis sylvatica Hoffm. – *Skógmunablóm* – Sjaldgæfur slæðingur frá ræktun á Akureyri og í nágrenni. ^{74, 134}

Echium vulgare L. – *Naðurkollur* – Fundinn á nokkrum stöðum á Suðvesturlandi og allt austur í Vík frá 1939 til 1964.⁹⁶ Á Reykjum í Mosfellssveit líklega innfluttur með hænsna- eða svínafoðri.¹¹¹ Óvíst um hann síðar.

Lamiaceae *Varablómsætt*

262. *Ajuga pyramidalis* L. – **Lyngbúi** – Mjög sjaldgæfur, aðeins á takmörkuðu svæði norðan til á Austfjörðum.^{21, 40, 45, 84}
263. *Prunella vulgaris* L. – **Blákolla** – Algeng á Suðurlandi frá Snæfellsnesi austur í Hornafjörð. Einnig víða á Austfjörðum, á Fljótsdalshéraði og innsveitum Eyjafjarðar. Annars staðar fátíðari, og þá einkum við jarðhita.
264. *Galeopsis tetrahit* L. – *Garðahjálmgras* – Slæðingur sem fundist hefur víða um land allt frá 1846 og er sums staðar ílendur.^{70, 137}
265. *Lamium album* L. – *Ljósatvítönn* – Allalgengur slæðingur frá ræktun, einkum frá höfuðborgarsvæðinu austur í Rangárvallasýslu og frá Húnavatnssýslu¹⁰⁶ austur í Eyjafjörð. Annars staðar fátíðari.
266. *Lamium amplexicaule* L. – *Varpvatvítönn* – Slæðingur sem finnst á nokkrum stöðum um landið í byggð,¹⁴⁰ algengust á Suðvesturlandi, ¹¹² einkum sem illgresi í matjurtagörðum.
267. *Lamium purpureum* L. – *Akurtvítönn* – Slæðingur sem finnst allvíða á landinu og er líklega orðinn ílendur á höfuðborgarsvæðinu.
268. *Thymus praecox* Opiz subsp. **arcticus** (E. Durand) Jalas – **Blóðberg** – Algengt um land allt.
269. *Mentha aquatica* L. – *Vatnamynta* – Ílendur slæðingur við jarðhita á þremur stöðum, Reykjanes við Djúp,¹³⁹ Einreykjahver á Reykhólum¹³⁴ og Svanshólslaug í Bjarnarfirði.⁶⁵
- Dracocephalum sibiricum* (L.) L. – *Siberiudrekakollur* – Mj. sj. slæðingur í Reykjavík 1943, áður greindur sem *Scutellaria galericulata*.¹³⁴
- Galeopsis bifida* Boenn. – *Skoruhjálmgras* – Sjaldgæfur slæðingur sem hefur sést á nokkrum stöðum frá 1940–1980, einkum við kartöflugarða.¹³⁴
- Galeopsis ladanum* L. – *Engjahjálmgras* – Mj. sj. slæðingur sem fundist hefur á tveimur stöðum á Suðvesturlandi 1928 og 1937.^{132, 134}
- Galeopsis speciosa* Miller – *Gullhjálmgras* – Hefur fundist nokkrum sinnum sem slæðingur á þrem stöðum frá 1914–1967.^{102, 134}
- Lamium confertum* Fries – *Garðatvítönn* – Sjaldgæfur slæðingur sem fundinn er á fáeinum stöðum.¹¹¹
- Lamium hybridum* Vill. – *Flipatvítönn* – Sjaldgæfur slæðingur sem fundist hefur á fáeinum stöðum.^{18, 102}
- Stachys macrantha* (K.Koch) Hyl. – *Álfakollur* – Ræktaður í görðum, slæðingur í Reykjavík.¹²⁹
- Mentha arvensis* L. – *Akurmýnta* – Mj. sj. slæðingur í Reykjavík 1946–1953.¹³⁴
- Mentha x gracilis* Sole – *Engjamýnta* – Mj. sj. slæðingur við Varmá í Mosfellssveit 1953.^{79, 108}
- Mentha longifolia* (L.) Huds. – *Grámýnta* – Slæðingur við Gufuneshöfða.
- Mentha spicata* L. – *Garðmýnta* – Mj. sj. slæðingur í Vestmannaeyjum 1960.^{134, 151}

Srophulariaceae Grímublómætt

270. *Limosella aquatica* L. – **Efjugras** – Á flæðum dreift um landið nema á Snæfellsnesi og Vestfjörðum. Þar aðeins fundin við Goðdal í Bjarnarfirði. ¹⁰
271. *Mimulus guttatus* DC – *Apablóm* – Ræktað til skrauts, en dreifist auðveldlega meðfram lækjum og hefur ílenst á nokkrum stöðum.¹³⁴ Aðgreining frá *Mimulus luteus* er ekki í öllum tilfellum örugg, og líklega er eitthvað um kynblendinga að ræða.
272. *Veronica alpina* L. – **Fjalladepla** – Algeng um land allt nema á láglandi Suðurlands. **Tvær deilitegundir eru báðar álíka algengar: subsp. alpina og subsp. pumila (All.) Pennell.**
273. *Veronica anagallis-aquatica* L. – **Laugadepla** – Mjög sjaldgæf, aðeins við jarðhita á fáeinum stöðum, mest á Suðurlandi.
274. *Veronica chamaedrys* L. – *Völudepla* – Talin aðflutt með norskum hvalveiðimönnum, einnig ræktað til skrauts og hefur ílenst á nokkrum stöðum.^{47, 111, 145}
275. *Veronica fruticans* Jacq. – **Steindepla** – Algeng víðast hvar, virðist fátíðari sunnan- og vestanlands en fyrir norðan og austan.
276. *Veronica officinalis* L. – **Hárdepla** – Algeng á Vesturlandi, og á Suðurlandi vestan Þjórsár og aftur í Eyjafjöllum og Mýrdal, einnig á Austfjörðum og í útsveitum á Miðnorðurlandi. Annars staðar sjaldgæf.
277. *Veronica persica* Poir. – *Varmadepla* – Sj., vex á nokkrum jarðhitasvæðum á Suðurlandi, og einnig sem slæðingur í Reykjavík. ^{134, 139}
278. *Veronica scutellata* L. – **Skriðdepla** – Víða um landið við tjarnir og leirur, algengust á Suðvesturlandi og miðju Norðurlandi.

279. *Veronica serpyllifolia* L. – **Lækjadepla** – Algeng um landið nema mjög sjaldgæf á Suðausturlandi frá Mýrdalssandi að Berufirði.
280. *Melampyrum sylvaticum* L. – **Krossjurt** – Allalgeng innst í Djúpi, við Steingrímsfjörð og Bjarnarfjörð á Ströndum, og í nágrenni Þorskafjarðar, einnig á nokkrum stöðum í Vaglaskógi. Ófundin annars staðar.
281. *Euphrasia calida* Yeo – **Hveraaugnfró** – Á örfáum stöðum suðvestanlands,¹⁵³ eingöngu við jarðhita. Talin vera einlend á Íslandi.
282. *Euphrasia frigida* Pugsl. – **Augnfró** – Algeng um land allt.
283. *Euphrasia stricta* D.Wolff ex J.F. Lehm. var. **tenuis** – **Kirtilaugnfró** – Sjaldgæf, fundin á nokkrum stöðum, einkum Suðvesturlandi, sums staðar við jarðhita.¹⁰⁵
284. *Rhinanthus minor* L. – **Lokasjóður** – Algengur um land allt nema á Miðhálandinu. Tvær deilitegundir eru taldar vera hér á landi, subsp. **minor** og subsp. **groenlandicus** (Ostenf.) Neuman, *eggjasjóður*. Þær hafa ekki reynst auðveldar í aðgreiningu,¹⁹ og er því lítið vitað um útbreiðslu þeirra.
285. *Pedicularis flammea* L. – **Tröllastakkur** – Víða til fjalla á Norður- og Austurlandi, sjaldgæfari í útsveitum. Mikið á hálandinu og nær þar suður fyrir jökla. Sjaldgæfari á Vesturlandi og ófundinn á Suðurlandi.
286. *Bartsia alpina* L. – **Smjörgras** – Algengt um allt land.
- Linaria repens* (L.) Miller – **Randagin** – Finnst sem slæðingur frá ræktun í Reykjavík.¹³⁴
- Linaria vulgaris* Miller – **Gullgin** – Sjaldgæfur slæðingur í Reykjavík 1958¹¹¹ og á Egilsstöðum árið 2000.¹³⁴
- Digitalis purpurea* L. – **Fingurbjargarblóm** – Ræktuð til skrauts, hefur fundist sem slæðingur á stöku stað.¹³⁴
- Veronica agrestis* L. – **Akurdepla** – Mj. sj. slæðingur, skráður í Reykjavík 1963.^{108, 111}
- Veronica arvensis* L. – **Reykjadepla** – Mj. sj., óx við Reykjalaug í Fnjóskadal frá 1932⁷¹–1975 a.m.k., hefur ekki sést þar síðar og er líklega horfin þaðan. Líkur eru á að hún hafi borist til landsins með grasfræi, sem sáð var við Reykjalaug nokkru fyrir 1932.⁶⁹
- Veronica gentianoides* Vahl – **Kósakkadepla** – Ræktuð í gördum, hefur dreifst og vex utan garðs á Ólafsfirði.
- Veronica hederifolia* L. – **Bergfléttudepla** – Mj. sj. slæðingur við flugvöllinn í Reykjavík.^{108, 111}
- Veronica longifolia* L. – **Langdepla** – Ræktuð til skrauts, slæðingur í Elliðaárdal.¹²⁹
- ~~*Veronica polita* Fries – **Gljádepla** – Hefur borist til landsins með grasfræi og sést í sáningum, en hefur ekki numið land nema sumarlengt.⁶⁴~~
- Rhinanthus angustifolius* C.C.Gmel. – **Meyjarsjóður** – Sjaldgæfur slæðingur sem sást hér öðru hvoru á fyrri áratugum síðustu aldar, líklega innfluttur með grasfræi.^{69, 74, 139} Engar heimildir eru um hann í seinni tíð.

Lentibulariaceae **Blöðrujurtarætt**

287. *Pinguicula vulgaris* L. – **Lyfjagras** – Algengt um land allt.
288. *Utricularia minor* L. – **Blöðrujurt** – Fundin allvíða í kringum landið, er líklega orðin sjaldséðari í seinni tíð síðan hætt var að grafa mógrafir og land hefur víða verið þurrkað.

Plantaginaceae **Græðisúruætt**

289. *Plantago lanceolata* L. – **Selgresi** – Algengt undir Eyjafjöllum, Vestmannaeyjum og Mýrdal. Annars aðeins sem sjaldgæfur slæðingur við jarðhita,¹⁰ þó ílendur í köldum jarðvegi í nágrenni við Reyki í Fnjóskadal.
290. *Plantago major* L. – **Græðisúra** – Allvíða um landið, ýmist við jarðhita eða sem slæðingur í byggð.
291. *Plantago maritima* L. – **Kattartunga** – Algeng um land allt, oftast í klettum eða á sjávarfitjum. Útbreiddari við sjávarsíðuna en lengra inni í landi.
292. *Littorella uniflora* (L.) Ascherson – **Tjarnalaukur** – Algengur á Suðvesturlandi frá Hvalfirði austur undir Markarfljót, sjaldgæfur annars staðar á landinu og ófundinn á Norðausturlandi frá Húsavík til Reyðarfjarðar.

Plantago arenaria Waldst. & Kit. – **Sandtunga** – Mj. sj. slæðingur í Reykjavík 1958–59.^{102, 111, 134}

~~*Plantago aristata* Michx. – **Broddatunga** – Mj. sj. slæðingur, aðeins fundinn í Reykjavík 1972.¹³⁴~~

Caprifoliaceae **Geitblaðsætt**

Lonicera caerulea L. – **Blátoppur** – Víða ræktaður í limgerði, slæðingur í Elliðaárdal 2004.¹²⁹

Valerianaceae *Garðabrúðuætt*

293. *Valeriana officinalis* L. – *Garðabrúða* – Ræktuð til skrauts í görðum og slæðist eitthvað þaðan.
294. *Valeriana sambucifolia* J.C.Mikan ex Pohl subsp. **procurrens** (Wallr.) Á.Löve. – *Hagabrúða* – Vex allvíða á Suðurlandi frá sunnanverðum Reykjanesskaga, um Fljótshlíð og Eyjafjöll og hefur fundist á nokkrum stöðum í Skaftafellssýslum allt austur í Hornafjörð. Þar sem aðgreining garðabrúðu og hagabrúðu er oft óljós, er ekki alltaf ljóst um hvora tegundina er að ræða á hverjum stað.⁷⁹

Dipsacaceae *Stúfuætt*

295. *Succisa pratensis* Moench – *Stúfa* – Allvíða á Suðurlandi í sólríkum brekkum frá suðurströnd Reykjanesskaga austur í Fljótshverfi.
296. *Knautia arvensis* (L.) Coulter – *Rauðkollur* – Sjaldgæfur slæðingur, einkum á nokkrum stöðum á Norðurlandi¹³⁴ og í nágrenni Reykjavíkur.¹³⁹

Campanulaceae *Bláklukkuætt*

297. *Campanula rotundifolia* L. – *Bláklukka* – Algeng á Austurlandi frá Þistilfirði suður á Síðu. Annars staðar aðeins sem slæðingur á smáblettum.
298. *Campanula uniflora* L. – *Fjallabláklukka* – Á nokkrum stöðum hátt til fjalla frá Skagafirði austur fyrir Eyjafjörð. Einnig fundin á Vatnsdalsfjöllum og Skjaldfannarfjalli við Djúp.
299. *Campanula glomerata* L. – *Höfuðklukka* – Harðgerð jurtt sem víða er ræktuð til skrauts, en slæðist frá ræktun, m.a. við Grafarvog. Hefur vaxið á Hesteyri í Jökulfjörðum allt síðan byggð var þar og blómstrar þar enn árið 2004.¹³⁴
- Campanula fragilis* Cyrill. – *Skrúðsklukka* – Hefur vaxið allengi sem slæðingur við Skrud á Núpi í Dýrafirði.¹⁰²
- Campanula latifolia* L. – *Risaklukka* – Slæðingur frá ræktun í Grafarvogi.¹³⁰
- Campanula patula* L. – *Vallarklukka* – Innfluttur slæðingur, meðal annars með grasfræi, en ílendist ekki.⁷⁴

Asteraceae *Körfublómaætt*

300. *Erigeron borealis* (Vierh.) Simmons – *Jakobsfífill* – Algengur um allt land.
301. *Erigeron humilis* R.C.Graham – *Snækobbi* – Allvíða en mjög strjáll á hálendinu norðan jökla frá Langjökli og austur úr. Einnig fundinn allvíða á háfjöllum við Eyjafjörð.
302. *Erigeron uniflorus* L. – *Fjallakobbi* – Víða á Miðhálandinu og til fjalla á Norður- og Austurlandi, annars sjaldgæfur. Skiptist í tvær deilitegundir, subsp. **uniflorus** og subsp. **eriocephalus** (J.Vahl) Cronq., *jöklakobbi*.
303. *Omalotheca norvegica* (Gunnerus) Schultz Bip. & F.W.Schmidt – *Fjandafæla* – Allvíða á snjóþungum stöðum um norðanvert landið og á Vestfjörðum, sjaldgæfari annars staðar og aðeins á hálendi sunnanlands.
304. *Omalotheca supina* (L.) DC. – *Grámulla* – Algeng um allt land þar sem hún finnur öruggt skjól undir snjó á veturna. Finnst að jafnaði ekki á láglandi í snjóléttum sveitum.⁴²
305. *Omalotheca sylvatica* (L.) Schultz Bip. & F.W.Schmidt – *Grájurt* – Fremur sjaldgæf, finnst einkum á Vesturlandi og Norðurlandi austur að Öxarfirði. Mjög sjaldgæf á Suður- og Austurlandi.
306. *Gnaphalium uliginosum* L. – *Grámygla* – Vex víða á Suðvesturlandi við jarðhita.
307. *Antennaria alpina* (L.) Gaertner subsp. **canescens** (Lange) Chmiel. – *Fjallalójurt* – Sjaldgæf jurtt sem vex á allmörgum stöðum við landræna loftslagið norðan Vatnajökuls, frá láglandi við Eyjafjörð upp að jöklu.
308. *Achillea millefolium* L. – *Vallhumall* – Algengur á landræna svæðinu norðaustan til á landinu, en annars staðar einkum í byggð.
309. *Achillea ptarmica* L. – *Silfurhnappur* – Vex í smáblettum á víð og dreif um landið, einkum við gamlar bæjartóftir sem eftirlega frá byggð. Hefur dreift sér nokkuð um og orðinn algerlega ílendur fyrir löngu meðfram Ölfusá.¹⁵²
310. *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J. Koch – *Baldursbrá* – Allalgeng í fjörum og við bæi kringum landið, þó sjaldséð á Suðurlandi austan Þjórsár, Norðausturlandi og á Norðurlandi vestra. Tvær deilitegundir eru á Íslandi: subsp. **subpolare** (Pobed.) Hämet-Ahti er algeng um

- allt land, bæði í fjörum og heima á bæjum. Subsp. **phaeocephalum** (Rupr.) Hämet- Ahti er nokkuð útbreidd, einkum á Suðvesturlandi.
311. *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt. – *Hlaðkolla* – Slæðingur sem barst til landsins um 1895, og hefur síðan breiðst hratt út um byggðir landsins.^{90, 111} Er nú algeng í öllum höfnum, athafnasvæðum og víða á sveitabæjum.
312. *Leucanthemum vulgare* Lam. – *Freyjubrá* – Algengur slæðingur í sáðsléttum og víðar, nú sums staðar orðinn ílendur.⁷⁴
313. *Tussilago farfara* L. – *Hóffífill* – Gamall slæðingur sem myndar þéttar breiður og hefur víða numið land og löngu ílendur.^{103, 111, 112, 114}
314. **Senecio vulgaris** L. – **Krossfífill** – Algengur á Suðvesturlandi frá Borgarfirði austur í Mýrdal, þar jafnvel fundinn nokkuð frá bæjum,¹⁴⁰ slæðingur hér og þar í byggð í öðrum landshlutum.
315. **Cirsium arvense** (L.) Scop. – **Pistill** – Ílendur en staðbundinn slæðingur á allmörgum stöðum.
316. *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill – *Purpurapistill* – Slæðingur sem fundist hefur á nokkrum stöðum, einkum á höfuðborgarsvæðinu, í Hveragerði og allt austur í Norðfjörð.⁹⁹
317. *Centaurea montana* L. – *Fjallakornblóm* – Fjölært skrautblóm sem slæðist stundum frá ræktun,^{111, 127} einkum í kaupstöðunum.
318. **Leontodon autumnalis** L. – **Skarifífill** – Algengur um land allt.
319. **Taraxacum spp.** – **Túnfíllar** – Skipting túnfílla í tegundir hefur hér á landi eins og annars staðar verið mjög á reiki, og ekki nema á færi sérfræðinga að greina þá til hlítar. M.P. Christiansen, danskur túnfíllasérfræðingur, greindi íslenska túnfílla niður í 116 tegundir.¹⁶ Gróflega er hægt að skipta þeim í þrjár til níu deildir og eru þessar helstar: **Erythrospemia** (*Taraxacum fulvum*), **Macrodongta** (*Taraxacum acromaurum*, *T. gibberosum*, *T. islandicum*, *T. latidens*), **Taraxacum** (*Taraxacum croceum*), **Spectabilia** (*Taraxacum crispifrons*, *T. faeroense*, *T. spectabile*, *T. vestmannicum*), **Naevosa** (*Taraxacum dilutisquamum*, *T. naevosum*, *T. triste*), **Ruderalia** (*Taraxacum officinale*). Lítið er vítað um útbreiðslu einstakra „tegunda“ eða deilda. *Taraxacum croceum* og *T. acromaurum* eru þó útbreiddastar um landið, einkum er *T. croceum* mikið til fjalla og á hálendinu. Hinar tegundirnar halda sig meira við láglendið og byggðirnar. Árið 2006 hófust rannsóknir og söfnun á íslenskum túnfíllum vegna *Flora Nordica*.
320. **Crepis paludosa** (L.) Moench – **Hjartafífill** – Sjaldgæfur, aðeins á útskögum beggja megin Eyjafjarðar.
321. *Pilosella aurantiaca* (L.) F.W.Schmidt & Schultz Bip. – **Roðafífill** – Ræktaður til skrauts víða um land, og sáir sér út og er víða að ílendast.
322. **Pilosella islandica** (Lange) Á.Löve – **Íslandsfífill** – Algengur um land allt, nema á Miðhálandinu.
323. **Hieracium acidotoides** (Dahlst.) Dahlst. – **Merkurfífill** – Algengur á Austfjörðum, annars sjaldgæfur á norðurhellingi landsins. Ófundinn á Suðurlandi frá Snæfellsnesi að Hornafirði.¹⁴
324. **Hieracium alpinum** L. – **Fellafífill** – Algengur um land allt.
325. **Hieracium anglicum** Fries – **Klausturfífill** – Algengur á Suðausturlandi frá Fljótshlíð norður á Fljótsdalshérað.¹⁴
326. **Hieracium aquiliforme** (Dahlst.) Dahlst. – **Arinfífill** – Algengur um land allt.¹⁴
327. **Hieracium arctocerinthe** Dahlst. – **Tígulfífill** – Algengur frá Faxaflóa austur um og norður að Vopnafirði, mjög sjaldgæfur annars staðar á landinu.¹⁴
328. **Hieracium arrostrocephalum** Omang – **Ingimarsfífill** – Víða á miðju Norðurlandi frá Fljóttum austur í Mývatnssveit.¹⁴
329. **Hieracium cretatum** Dahlst. – **Vallafífill** – Víða, nema ófundinn á Norðausturlandi og Austfjörðum.¹⁴
330. **Hieracium demissum** (Stroemf.) Dahlst. – **Skallafífill** – Allalgengur á Suðurlandi frá Hvalfirði austur í Hamarsfjörð.¹⁴
331. **Hieracium elegantiforme** Dahlst. – **Glæsifífill** – Hefur miðsvæðaútbreiðslu, algengur á Vestfjörðum, norðantil á Tröllaskaga og á Austfjörðum.¹⁴
332. **Hieracium holopleurum** Dahlst. – **Runnafífill** – Algengur.¹⁴
333. **Hieracium leucodetum** Omang – **Hærufífill** – Allvíða á Vesturlandi frá Faxaflóa að Hrutafirði, einnig á miðju Norðurlandi frá Skagafirði austur í Mývatnssveit.¹⁴
334. **Hieracium lygistodon** Dahlst. – **Vargsfífill** – Algengur.¹⁴
335. **Hieracium macrocomum** Dahlst. – **Brekkuvífill** – Víða á Suðvesturlandi frá Snæfellsnesi austur í Fljótshverfi.¹⁴

336. **Hieracium magnidens** Dahlst. – **Kvislifífill** – Hefur miðsvæðaútbreiðslu, víða á Vestfjörðum, miðju Norðurlandi og norðan til á Austfjörðum. ¹⁴
337. **Hieracium microdon** (Dahlst.) Omang – **Holtafífill** – Algengur á vestanverðu landinu, ófundinn á Norðausturlandi frá Kelduhverfi suður að Lónsheiði. ¹⁴
338. **Hieracium phrixoclonum** (Omang) Omang – **Kögurfífill** – Dreifður um landið, en ekki algengur. ¹⁴
339. **Hieracium pullicalicium** Omang – **Skeggfífill** – Víða á Suðurlandi frá Hvalfirði austur í Álftafjörð. ¹⁴
340. **Hieracium stictophyllum** Dahlst. ex W.R. Linton – **Blettafífill** – Víða á Suðurlandi frá Kjósinni austur um og norður að Unaósi. ¹⁴
341. **Hieracium stoedvareense** Omang – **Stöðvarfífill** – Víða eða algengur á Austfjörðum frá pistilfirði suður í Hornafjörð. ¹⁴
342. **Hieracium stroemfeltii** Dahlst. – **Vinafífill** – Allvíða um land, nema síst á Suðvesturlandi. ¹⁴
343. **Hieracium thaectolepium** Dahlst. – **Hliðafífill** – Algengur víðast hvar nema á Norðausturlandi, ófundinn frá Tjörnesi austur á Digranes. ¹⁴
344. **Hieracium thulense** Dahlst. – **Skrautfífill** – Fremur sjaldgæfur á svæðunum frá Snæfellsnesi til Vestfjarða og frá Tröllaskaga austur í Mývatnssveit. Ófundinn annars staðar. ¹⁴
- Aster linosyris (L.) Bernh. – *Gullstjarna* – Innflutt og ræktað í gördum, slæðist eitthvað út fyrir garða, t.d. í Kópavogi. ¹³⁴
- Bellis perennis L. – *Fagurfífill* – Ræktaður í gördum, villtur í grasflötum á nokkrum stöðum í eldri kaupstöðum, m.a. Reykjavík, Ísafirði, Siglufirði, Akureyri, Seyðisfirði, Norðfirði, Reyðarfirði og Vestmannaeyjum. ^{111, 114, 137} Einnig eru dæmi um að hann hafi borist sem slæðingur með grasfræi. ⁴⁴
- Filago vulgaris Lam. – *Knappmulla* – Skráð sem slæðingur á Reynistað í Skagafirði. ¹³⁸
- Rudbeckia laciniata L. – *Sólhattur* – Mj. sj. slæðingur að Reykjalandi í Mosfellssveit. ^{17, 99, 111}
- Helianthus annuus L. – *Sólblóm* – Mjög sjaldgæfur slæðingur við Gamla Hraun ¹⁴⁷ á Eyrarbakka 1950. ^{111, 134}
- Anthemis arvensis L. – *Akurgæsajurt* – Skráð sem slæðingur á allmörgum stöðum í byggð frá 1890– 1970. ^{112, 116} Óvíst hvort hún helst nokkurs staðar við til lengdar.
- Anthemis tinctoria L. – *Gullgæsajurt* – Slæðingur með innfluttu grasfræi á örfáum stöðum. ¹³⁹
- Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. – *Völvubrá* – Slæðingur sem dreifist með grasfræi, sést því víða í sáðsléttum og vegsáningum. Óvíst hversu varanleg hún er. ^{64, 134}
- Matricaria recutita L. – *Kryddbaldursbrá* – Mj. sj. slæðingur á höfuðborgarsvæðinu og í Hveragerði. ^{18, 134}
- Tanacetum vulgare L. – *Regnfang* – Ræktað í gördum áður fyrr. Er oft lífseig eftirlega í gömlum gördum en dreifir sér lítið út. ^{111, 129, 147}
- Artemisia vulgaris L. – *Malurt* – Vex sem slæðingur á örfáum stöðum, ^{129, 151} gæti verið að ílendast.
- Petasites hybridus (L.) P.Gaertner – *Hrossafífill* – Hefur sést sem slæðingur í Reykjavík og á Akureyri fyrir og um miðja 20. öldina. ^{67, 74, 111.} [Sást aftur sumurin 2008 og 2009 bæði í Reykjavík og Kópavogi.](#)
- Doronicum orientale Hoffm. – *Hjartarfífill* – Ræktaður til skrauts í gördum, slæðingur í Elliðaárdal. ¹²⁹
- Senecio pseudo-arnica Less. – *Stormþulur* – Slæðingur frá ræktun í Elliðaárdal. ¹²⁹
- Senecio sylvaticus L. – *Trönuþulur* – Slæðingur undir fiskhjöllum á Suðurnesjum 2007.
- Senecio vernalis Waldst. & Kit. – *Vorþulur* – Sjaldgæfur slæðingur í vegsáningum. ⁶⁴
- Centaurea cyanus L. – *Garðakornblóm* – Slæðingur sem hefur fundist á nokkrum stöðum við bæi og í túnum, ^{74, 139} einkum á fyrri hluta síðustu aldar, en ílendist hvergi. Einnig ræktað sem einært garðblóm.
- Centaurea scabiosa L. – *Fagurkornblóm* – Mj. sj. slæðingur, við Stokkanes í Skutulsfirði 1948. ⁷⁶
- Centaurea triumfettii All. – *Flauelskornblóm* – Skrautjurt sem lengi hefur verið í ræktun og helst nokkuð sem eftirlega í gömlum gördum, en ílendist líklega ekki. ¹²⁷
- Tragopogon pratensis L. – *Hafursskeggfífill* – Slæðingur sem vex á nokkru svæði við norðanverðan Grafarvog, líklega upprunalega komið með grasfræi. ¹³⁰
- Sonchus arvensis L. – *Grísafífill* – Slæðingur á nokkrum stöðum á Suðvesturlandi, m.a. við Umferðamiðstöðina í Reykjavík. ^{92, 117}
- Sonchus asper (L.) Hill – *Galtarfífill* – Slæðingur sem sést hefur á nokkrum stöðum á Suðvesturlandi, í Vestmannaeyjum, Hornafirði og á Akureyri. ^{74, 92, 111, 134}
- Sonchus oleraceus L. – *Gyltufífill* – Slæðingur sem fundist hefur á tveim stöðum á landinu. ^{102, 111}
- Lactuca serriola L. – *Þyrnisalat* – Mj. sj. slæðingur við fiskverksmiðjuna Dverg í Reykjavík um 1950. ¹⁰⁶
- Mycelis muralis (L.) Dumort. – *Skógarsalat* – Mj. sj. slæðingur fundinn í Reykjavík um 1950. ^{95, 111}
- Lapsana communis L. – *Hérafífill* – Hefur fundist á nokkrum stöðum á landinu frá 1923–1973, einkum á Suðvesturlandi. ^{108, 149}
- Crepis capillaris (L.) Wallr. – *Fálkaskegg* – Slæðingur við Gróðrarstöðina á Akureyri 1927. ⁷⁴

Hydrocharitaceae *Froskabláðsætt*

Egeria densa Planchon – *Kransarfi* – Mj. sj. slæðingur, aðeins fundinn í Opnunum í Ölfusi í volgri tjörn. Hefur vaxið þar allengi og þekur nú stóran hluta af botni hennar og virðist vera að ílendast.

Juncaginaceae *Sauðlauksætt*

345. *Triglochin maritima* L. – *Strandsauðlaukur* – Hér og hvar á sjávarflæðum umhverfis landið, þó sjaldséður við suðurströndina austan Ölfusár og á Norðausturlandi frá Skjálfanda að Þistilfirði, og á Norðurlandi vestra frá Fljótum vestur á Strandir.

346. *Triglochin palustris* L. – *Mýrasauðlaukur* – Algengur um land allt, nema sums staðar á hálendinu.

Potamogetonaceae *Nykruætt*

347. *Potamogeton alpinus* Balbis – *Fjallnykra* – Algeng í tjörnum og vötnum nema á Miðhálandinu.

348. *Potamogeton berchtoldii* Fieber – *Smánykra* – Víða um landið á láglandi í grunnnum vötnum.

349. *Potamogeton gramineus* L. – *Grasnykra* – Algeng á láglandi um land allt, nema helst á Vestfjörðum.

350. *Potamogeton natans* L. – *Blöðkunykra* – Algeng í vötnum á Suðvesturlandi frá Þjórsá vestur á Snæfellsnes, og á Fljótsdalshéraði. Á nokkrum stöðum öðrum, einkum á Norðurlandi vestanverðu.

351. *Potamogeton perfoliatus* L. – *Hjartanykra* – Víða um land, einkum í vötnum sem hitna á sumrin, sjaldgæf á Vestfjörðum og Norðausturlandi, ófundin á Miðhálandinu.

352. *Potamogeton praelongus* Wulfen – *Langnykra* – Allvíða í stærri vötnum, einkum um landið norðanvert og á Fljótsdalshéraði.

353. *Stuckenia filiformis* (Pers.) Börner – *Práðnykra* – Algeng um land allt.

354. *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande – *Lónajurt* – Sjaldgæf jurt í sjávarlönnum umhverfis landið.²¹ Ófundin við Suðurströndina frá Mýrum vestra austur í Hornafjörð.

355. *Ruppia maritima* L. – *Lónajurt* – Fundin á Austurlandi, einkum við Lónsfjörð.

Zannichelliaceae *Hnotsörvaætt*

356. *Zannichellia palustris* L. – *Hnotsörvi* – Sjaldgæfur, en fundinn á allmörgum stöðum dreift um landið.

Zosteraceae *Marhálmsætt*

357. *Zostera angustifolia* (Hornem.) Rchb. – *Marhálmur* – Víða í fjörum á Vesturlandi frá Reykjanesi norður á Strandir, annars staðar sjaldgæfur. Fundinn við Melrakkasléttu,¹⁴² Vopnafjörð og í Lóni.

Sparganiaceae *Brúsakollsætt*

358. *Sparganium angustifolium* Michx. – *Trjónubrúsi* – Fremur sjaldgæfur en fundinn á víð og dreif um landið.

359. *Sparganium hyperboreum* Laest. ex Beurl. – *Mógrafabrúsi* – Algengur um land allt.

360. *Sparganium natans* L. – *Tjarnabrúsi* – Víða um land allt.

Trilliaceae *Ferlaufungsætt*

361. *Paris quadrifolia* L. – *Ferlaufungur* – Sjaldgæf jurt sem vex mjög strjált um landið. Flestir fundarstaðir eru á Suðvesturlandi, Suðurlingeyjarsýslu og á Vestfjörðum. Annars staðar ófundinn eða miklu sjaldgæfari.

Tofieldiaceae *Sýkigrasætt*

362. *Tofieldia pusilla* (Michx.) Pers. – *Sýkigras* – Algengt um land allt.

Liliaceae Liljuætt

Lilium bulbiferum L. – **Eldlilja** – Ræktuð nokkuð í gördum, og hefur lítils háttar slæðst þaðan, m.a. í Elliðaárdal¹²⁹ og við Rauðavatn.

Iridaceae Sverðliljuætt

Iris pseudacorus L. – *Tjarnasverðlilja* – Mj. sj. slæðingur sem fundist hefur á tveim stöðum, Varmá í Mosfellssveit 1982 og í Sandgerði 1996.¹³⁴

Alliaceae Laukaætt

363. **Allium oleraceum** L. – **Villilaukur** – Innfluttur til ræktunar á nokkrum stöðum á fyrri öldum,¹³⁷ hefur dreifst nokkuð og haldist við a.m.k. á tveim stöðum síðan.^{87, 115}

Allium schoenoprasum L. – *Graslaukur* – Innfluttur til ræktunar, dreifist lítið en hefur haldist við milli ára á nokkrum stöðum utan garðs í þéttbýli.¹¹¹

Orchidaceae Brönugrasætt

364. **Dactylorhiza maculata** (L.) Soó – **Brönugrös** – Allvíða um landið, einkum í útsveitum, vantar sums staðar alveg á stórum svæðum.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – *Ástagrös* – eru af sumum talin vaxa á Íslandi, en staðfest eintök vantar.

365. **Coeloglossum viride** (L.) Hartman – **Barnarót** – Algeng um land allt.

366. **Platanthera hyperborea** (L.) Lindley – **Friggjargras** – Algengt um land allt.

367. **Pseudorchis straminea** (Fernald) Soó subsp. **straminea** – **Hjónagras** – Algengt, einkum á Norður- og Austurlandi, heldur fátíðari á Suðurog Vesturlandi.

368. **Listera cordata** (L.) R.Br. – **Hjartatvíblaðka** – Algeng á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum, sjaldgæf á Suðurlandi nema í Þórsmörk. Sums staðar tíðari í útsveitum en inn til landsins.

369. **Listera ovata** (L.) R.Br. – **Eggtvíblaðka** – Sjaldgæf en nokkuð dreifð um landið, ófundin á Norðausturlandi frá Tjörnesi austur í Vopnafjörð.

370. **Corallorhiza trifida** Châtel. – **Kræklurót** – Allalgeng um allt land, en vex mjög strjált.

Juncaceae Sefætt

371. **Juncus alpinoarticulatus** Chaix subsp. **alpestris** (Hartm.) Hämet-Ahti – **Mýrasef** – Algengt nema á hærri hlutum hálendisins.

372. **Juncus arcticus** Willd. subsp. **intermedius** Hyl. – **Hrossanál** – Algeng um land allt. Deilitegundin subsp. **arcticus**, *tryppanál*, er hér einnig, einkum til fjalla og á hálendinu. Hún er hins vegar ekki vel aðgreind frá hrossanálinni, og því óljóst með útbreiðslu hennar.

373. **Juncus articulatus** L. – **Laugasef** – Víða um land á láglandi og við jarðhita.

374. **Juncus balticus** Willd. – **Fitjanál** – Upphaflega var íslenska hrossanálin talin til þessarar tegundar, þótt hún sé nokkuð frábrugðin henni eins og hún birtist í Skandinavíu. Hins vegar virðist mér ljóst að ofurlítið hluti íslenskra hrossanála, sem einkum finnast á undirlendi Suðurlandsins, teljast vera *J. balticus*, sem ég legg hér með til að sé nefnd fitjanál á íslensku til aðgreiningar frá hrossanálinni.

375. **Juncus biglumis** L. – **Flagasef** – Algengt um allt land.

376. **Juncus bufonius** L. – **Lækjasef** – Algengt á láglandi, aðeins við jarðhita á hálendinu.

377. **Juncus bulbosus** L. – **Hnúðsef** – Algengt á Suðvesturlandi frá Eyjafjöllum norður á Snæfellsnes, annars staðar strjált eða sjaldgæft.

378. **Juncus castaneus** Sm. – **Dökkasef** – Algengt á Austurlandi frá Bakkafirði suður í örfæfi. **ög norðvestantil á Vestfjörðum. Annars staðar mjög sjaldgæft.**

379. **Juncus filiformis** L. – **Þráðsef** – Algengt á norðanverðu landinu frá Breiðdalsvík og vestur á Snæfellsnes, allvíða á Suðvesturlandi, sjaldgæft frá Ölfusá austur í Mýrdal, ófundin þar fyrir austan að Lóni.

380. *Juncus gerardii* Loisel. – **Fitjasef** – Mjög sjaldgæft, aðeins fundið á smáblettum við Leirárvog í Mosfellssveit² og á Knarrarnesi við Eyjafjörð⁶⁵.
381. *Juncus leucochlamys* V.J.Zinger ex V.I.Krecz. – **Vestrased** – Allvíða á Vestfjörðum og á nokkrum stöðum á Skaga. Sjaldgæf á Suðvesturlandi.
382. *Juncus ranarius* Nees ex Song. & Perr. – **Lindased** – Allvíða um land en fremur strjált.
383. *Juncus squarrosus* L. – **Stinnased** – Sjaldgæft, aðeins fundið á tveim svæðum, öðru á Vestfjörðum milli Bjarnarfjarðar syðri og Ófeigsfjarðar, ^{46, 48, 73} og hinu á Austfjörðum milli Fáskrúðsfjarðar og Borgarfjarðar.^{21, 100}
384. *Juncus trifidus* L. – **Móased** – Algengt um land allt.
385. *Juncus triglumis* L. – **Blómased** – Algengt í flögum um land allt.
386. *Luzula arcuata* (Wahlenb.) Swartz – **Boghæra** – Algeng hátt til fjalla um allt land.
387. *Luzula confusa* Lindeb. – **Fjallhæra** – Fremur sjaldgæf, aðeins til fjalla. Óvíst er um útbreiðslu, sennilega algengust á Vestfjörðum. Aðgreining boghæru og fjallhæru er óglögg, enda hafa báðar oftast sameiginlega gengið undir nafninu fjallhæra hér á landi án aðgreiningar.
388. *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej. – **Vallhæra** – Algeng frá láglandi upp að 6–700 m hæð. Mest af íslensku vallhærinni mun tilheyra subsp. **frigida** (Buchenau) Sam., en líklega eru hér einnig subsp. **congesta** (Thuill.) Arcan. *kollhæra* og subsp. **multiflora** en mjög er óljóst um útbreiðslu þessara deilitegunda á landinu. Subsp. *multiflora* gæti verið innflutt með landnámsmönnum og því aðallega í byggð og á láglandi¹⁹, en subsp. *congesta* er talin hafa hafræna útbreiðslu.
- ~~387. *Luzula pallescens* Sw. – **Ljóshæra** – Hefur fundist á nokkrum stöðum, m.a. undir Eyjafjöllum og í Döllum¹³⁴~~
389. *Luzula spicata* (L.) DC. – **Axhæra** – Algeng um land allt.
390. *Luzula sudetica* (Willd.) DC. – **Dökkhæra** – Allalgeng á norðanverðu landinu og Vestfjörðum, annars sjaldgæf.

Cyperaceae Stararætt

391. *Eriophorum angustifolium* Honckeny – **Klóifá** – Algeng um allt land.
392. *Eriophorum scheuchzeri* Hoppe – **Hrafnaflá** – Algeng um allt land.
393. *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm. – **Myrafíningur** – Algengur með ströndum fram frá Árnassýslu vestur, norður og austur um allt suður til Berufjarðar. Sjaldgæfur eða vantar í innsveitum og austan Þjórsár á Suðurlandi.
394. *Eleocharis acicularis* (L.) Roemer & Schultes – **Efjuskúfur** – Allvíða á flæðum við vötn og ár. Á Vestfjörðum aðeins fundinn við jarðhita í Reykjarfirði nyrðri.⁴⁸
395. *Eleocharis palustris* (L.) Roemer & Schultes – **Vatnsnál** – Algeng á láglandi um allt land, nema sjaldséð á norðanverðum Vestfjörðum.
396. *Eleocharis mamillata* H. Lindb. – **Birtuskúfur** – Mj. sj. Greind frá Reykjum í Ólafsfirði.
397. *Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz – **Fitjaskúfur** – Algengur um allt land.
398. *Eleocharis uniglumis* (Link) Schultes – **Vætuskúfur** – Algengur á Suðurlandi frá Snæfellsnesi austur um til Hornafjarðar. Sjaldgæfur á norðanverðu landinu.
399. *Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori – **Pursaskegg** – Algengt um allt land.
400. *Carex adelostoma* W.I.Krecz. – **Hrisastör** – Fundin á örfáum stöðum um norðanvert landið vestan Eyjafjarðar.^{11, 89} Greining sumra eintakanna er vafasöm, og því óljóst um útbreiðslu.
401. *Carex atrata* L. – **Sótstör** – Nokkuð algeng stör og dreifð um allt landið, en afar strjál.
402. *Carex bicolor* All. – **Hvítstör** – Allvíða á hálendinu norðaustanverðu og meðfram ám sem renna frá því. Einnig víða meðfram Vatnajökli að suðaustanverðu, við Langjökul og umhverfis Drangajökul.
403. *Carex bigelowii* Torrey ex Schweinitz subsp. **rigida** W. Schulze-Motel – **Stinnastör** – Mjög algeng um land allt.
404. *Carex brunnescens* (Pers.) Poiret – **Línstör** – Sjaldgæf, algengust um norðaustanvert landið. Hvarvetna þar sem hún vex er mjög lítið af henni, oftast örfáir smátöppar.
405. *Carex canescens* L. – **Blátoppastör** – Algeng um allt land á láglandi.
406. *Carex capillaris* L. – **Hárleggjastör** – Tvær deilitegundir eru hér á landi: subsp. **fuscidula** er algeng um allt land, en subsp. **capillaris** fremur sjaldgæf.

407. *Carex capitata* L. – **Hnappstör** – Algeng á landræna svæðinu norðan jökla, annars víða um land nema ófundin á norðanverðum Vestfjörðum.
408. *Carex caryophyllea* Latourr. – **Vorstör** – Mjög sjaldgæf, aðeins á einum stað á litlu svæði skammt frá Herdísarvík.⁵⁹
409. *Carex chordorrhiza* Ehrh. ex L. fil. – **Vetrarkvíðastör** – Algeng í votlendi um land allt, nema fremur fátíð á Suðausturlandi frá Markarfljóti austur í Öræfi, og strjál á Vestfjörðum.
410. *Carex demissa* Hornem. – **Grænstör** – Sjaldgæf. Eintök frá Bjarnarhóli, Lýsuhóli og Langavatni á Snæfellsnesi, Ingólfsfirði, Norðfirði og Reykjavík hafa verið greind til þessarar tegundar, en annars óvíst um útbreiðslu.¹³⁴
411. *Carex diandra* Schrank – **Safastör** – Fremur sjaldgæf um sunnanvert landið frá Öræfum vestur á Snæfellsnes.^{28, 146}
412. *Carex dioica* L. – **Sérbylisstör** – Algeng nema á Suðurlandi, sjaldgæf frá Þjórsá austur að Skeiðarársandi.
413. *Carex echinata* Murray – **Ígulstör** – Algeng í útsveitamýrum á svokölluðum miðsvæðum (Snæfellsnes, Vestfirðir, Miðnorðurland og norðanverðir Austfirðir), annars staðar fremur sjaldséð.
414. *Carex flacca* Schreber – **Grástör** – Víða á Suðurlandi og norðanverðum Austfjörðum í þurrlendi, ófundin annars staðar.
415. *Carex flava* L. – **Trjónustör** – Mjög sjaldgæf. Fundin á örfáum stöðum á Látraströnd og í Fjörðum,^{67, 71} einnig á Fljótshéiði á einum stað.
416. *Carex glacialis* Mackenzie – **Dvergstör** – Algeng eða víða á landræna svæðinu norðan jökla og allt vestur fyrir Langjökul. Mjög sjaldséð annars staðar á landinu.
417. *Carex glareosa* Wahlenb. – **Heigulstör** – Algeng meðfram sjó í kringum landið, sjaldgæf inni í landi.
418. *Carex heleonastes* Ehrh. ex L. fil. – **Heiðastör** – Mjög sjaldgæf, aðeins í rennandi blautum flóum um norðanvert landið.⁷⁸
419. *Carex krausei* Boeck. – **Toppastör** – Útbreidd á landræna svæðinu norðan jökla, einkum á hálendinu. Sjaldgæf á hálendinu sunnan jökla og meðfram Vatnajökli að sunnanverðu.
420. *Carex lachenalii* Schkuhr – **Rjúpastör** – Algeng til fjalla um land allt, vantar eða er sjaldgæf á láglandi.
421. *Carex limosa* L. – **Flóastör** – Allvíða í blautum flóum á láglandi, einkum sunnan og vestanlands.
422. *Carex livida* (Wahlenb.) Willd. – **Fölvastör** – Sjaldgæf, vex í rennblautum flóum, algengust vestur á Mýrum og á utanverðu Fljótsdalshéraði.⁴⁴
423. *Carex lyngbyei* Hornem. – **Gulstör** – Algeng eða víða um land allt.
424. *Carex mackenziei* V.I.Krecz. – **Skriðstör** – Víða á sjávarfitjum kringum landið frá Reykjanesskaga norður og austur um að Hornafirði. Ófundin á Suðurlandi.
425. *Carex macloviana* d'Urv. – **Kollstör** – Finnst allvíða á smáblettum á landræna svæðinu norðan jökla, algengust í inndölum norðanlands. Stakir fundarstaðir ná vestur að Miðfirði og suður yfir miðhálandið.
426. *Carex maritima* Gummerus – **Bjúgstör** – Algeng með ströndum landsins og meðfram stórfjótum, einnig víða á sandeyðimörkum miðhálandisins.
427. *Carex microglochin* Wahlenb. – **Broddastör** – Allalgeng um land allt.
428. *Carex nardina* Fries – **Finnungsstör** – Sjaldgæf, finnst á háfjöllum við Eyjafjörð og á hálendinu norðan Vatnajökuls og Hofsjökuls.
429. *Carex nigra* (L.) Reichard – **Mýrastör** – Algeng um land allt. Afbrigðið var. **juncella** (Fries) Lemke, *þúfustör*, er talið fundið hér,¹⁴⁹ en óvíst er um útbreiðslu þess.
430. *Carex norvegica* Retz. – **Fjallastör** – Algeng nema á Suðurlandi, þar sjaldgæf.
431. *Carex pallescens* L. – **Gljástör** – Aðeins fundin á tveim stöðum,⁷⁵ þó líklega útdauð á öðrum.⁶⁵
432. *Carex panicea* L. – **Belgjastör** – Algeng á láglandi.
433. *Carex paupercula* Michx. – **Keldustör** – Fremur sjaldgæf, finnst helst í mýrum á fremur snjóþungum svæðum, einkum á Austfjörðum, Miðnorðurlandi og Vestfjörðum suður í hálendi Mýrasýslu.
434. *Carex pilulifera* L. – **Dúnhulstrastör** – Víða í nokkrum útsveitum: Reykjanesskaga, Snæfellsnesi, hluta Vestfjarða, Miðnorðurlandi og nyrðri hluta Austfjarða, vantar eða er mjög sjaldséð annars staðar.

435. *Carex pulicaris* L. – **Hagastör** – Allvíða á Snæfellsnesi,¹¹⁰ í Strandasýslu^{21,77} og norðurhluta Austfjarða,⁹³ annars sjaldgæf.
436. *Carex rariflora* (Wahlenb.) Sm. – **Hengistör** – Algeng um land allt, einkum í hálendis- og fjallamýrum.
437. *Carex rostrata* Stokes – **Tjarnastör** – Algeng í mýrum og tjörnum um allt land.
438. *Carex rufina* Drejer – **Rauðstör** – Víða eða allalgeng á snjóþungum stöðum, einkum á miðhálandinu, en einnig til fjalla á Vestfjörðum, Miðnorðurlandi og á Austfjörðum.¹⁴¹
439. *Carex rupestris* All. – **Móastör** – Algeng, þó með nokkrum gloppum, á landræna svæðinu norðan jökla, mjög sjaldgæf annars staðar.
440. *Carex ramenskii* Kom. – **Marstör** – Víða á sjávarfitjum nema á Suðurlandi.
441. *Carex saxatilis* L. – **Hrafnastör** – Algeng um mestallt landið, vantar þó víða á láglandi sunnanlands.
442. *Carex viridula* Michx. – **Gullstör** – Hér og hvar um landið, einkum í útsveitum, ófundin á ýmsum svæðum. Öll eintök virðast tilheyra subsp. **viridula** en ekki subsp. **pulchella**.
443. *Carex subspathacea* Wormsk. – **Flæðastör** – Víða á sjávarfitjum í kringum landið, nema við Suðurströndina. Þar aðeins fundin á einum stað í Baugsstaðafjöru við Stokkseyri.
444. *Carex vaginata* Tausch – **Slíðrastör** – Algeng á láglandi nema á Suðurlandi frá Þjórsá að Hornafirði, þar mjög sjaldséð.

Poaceae Grasætt

445. *Danthonia decumbens* (L.) DC. – **Knjápuntur** – Mjög sjaldgæfur, aðeins fundinn á einum stað í Herjólfssdal í Vestmannaeyjum.⁹
446. *Milium effusum* L. – **Skrautpuntur** – Allvíða í útsveitum á Norðurlandi og Vestfjörðum, annars sjaldgæfur.
447. *Hierochloa odorata* (L.) Beauv. – **Reyrgresi** – Algengt.
448. *Anthoxanthum odoratum* L. – **Ilmreyr** – Algengur um allt land. Tvær deilitegundir, subsp. **odoratum** og subsp. **alpinum** (Á. & D.Löve) B.M.G. Jones & Melderis, **eru á Íslandi**. Subsp. **alpinum** er algeng um allt landið. Subsp. **odoratum** hefur einkum fundist á Suðurlandi og aðeins á láglandi, og gæti verið aðflutt eftir landnám.
449. *Phleum alpinum* L. – **Fjallafoxgras** – Algengt um land allt, nema síst á láglandi Suðurlands.
450. *Phleum pratense* L. – **Vallartoxgras** – Ræktað um allt land til fóðurframleiðslu, þroskar vel fræ og sáir sér nokkuð út og er löngu orðið ílent.
451. *Alopecurus aequalis* Sobol. – **Vatnsliðagras** – Algengt víða um land, einkum í grunnum vötnum.
452. *Alopecurus geniculatus* L. – **Knjáliðagras** – Á víð og dreif um mestallt landið.
453. *Alopecurus pratensis* L. – **Háliðagras** – Innflutt til grasræktar í lok 19. aldar, sáir sér mikið út og er löngu orðið ílent í nágrenni byggða.
454. *Agrostis capillaris* L. – **Hálingresi** – Algengt um land allt í hlíðabollum og skóglendi.
455. *Agrostis stolonifera* L. – **Skríðlingresi** – Algengt um land allt, einkum í votlendi.
456. *Agrostis vinealis* Schreber – **Týtulíngresi** – Algengt um land allt, einkum í þurrum brekkum, gras- og malarbrekkum.
457. *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) P.Gaertn. subsp. **groenlandica** (Schrank) Matuszk. – **Hálmgresi** – Mjög algengt um allt land í deiglendi og mýrum, ekki síst á hálendinu.
458. *Holcus lanatus* L. – **Loðgresi** – Algengt á nokkru svæði austan Markarfljóts, undir Eyjafjöllum og í Mýrdal.¹⁴⁶ Annars staðar aðeins sem sjaldgæfur slæðingur.
459. *Deschampsia alpina* (L.) Roemer & Schultes – **Fjallapuntur** – Algengur um land allt.
460. *Deschampsia beringensis* Hult. – **Beringspuntur** – Innfluttur á síðari hluta síðustu aldar, mikið notaður í uppræðslu meðfram vegum síðari árin og er lífseigur í þeim og víða orðinn ílendur.
461. *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv. – **Snarrótarpuntur** – Algengur um land allt nema á Suðausturlandi og á Vestfjörðum aðeins sem slæðingur í túnum og í byggð.
462. *Avenella flexuosa* (L.) Drejer – **Bugðupuntur** – Algengur um land allt í grasríku mólendi og kjarri.
463. *Avenula pubescens* (Hudson) Dumort. – **Dúnhafri** – Slæðingur sem hefur birst sífellt víðar um landið síðan 1937,^{43,134} og er sums staðar orðinn ílendur.

464. *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl – **Ginhafri** – Vex villtur aðeins á einum stað, undir fuglabjörgum við Pétursey í Mýrdal. ⁸²
465. *Trisetum spicatum* (L.) K.Richter – **Fjallalógresi** – Algengt um land allt, einkum til fjalla.¹¹⁸
466. *Trisetum triflorum* (Bigel.) Á.Löve & D.Löve – **Móalógresi** – Algengt á láglandi um land allt.¹¹⁸
467. *Sesleria albicans* Kit. ex Schultes – **Blátoppa** – Á nokkrum stöðum frá Kollafirði suður að Kleifarvatni.⁵² Utan þess svæðis aðeins fundin á tveim stöðum, Fagurhólsmýri¹⁴³ og við Tófuhorn í Lóni.⁵⁶
468. *Catabrosa aquatica* (L.) P.Beauv. – **Vatnsnarfagras** – Víða um land bæði á láglandi og til fjalla.
469. *Briza media* L. – **Hjartapuntur** – Mjög sjaldgæfur, aðeins á litlu svæði við Grafarvog í Reykjavík, óvíst hversu lengi hann hefur vaxið þar.¹²⁵
470. *Dactylis glomerata* L. – **Axhnoðapuntur** – Innfluttur sem sáðgresi í túnum, a.m.k. síðan 1920. Hefur sáð sér út og ílenst á mörgum stöðum.
471. *Poa alpina* L. – **Fjallasveifgras** – Algengt um land allt, síst þó á láglandi á Suðurlandi. Tvö afbrigði eru hér á landi, var. **vivipara** L. sem hefur blaðgróinn punt, og var. **alpina** sem ekki er blaðgróðið. Síðarnefnda afbrigðið vex einkum á láglandi.
472. *Poa annua* L. – **Varpasveifgras** – Algengt um land allt nema fremur sjaldséð á Miðhálandinu.
473. *Poa flexuosa* Sm. – **Lotsveifgras** – Allalgengt hátt til fjalla, oftast ofan 700 m.¹⁴³ Sjaldgæft á Vestfjörðum.
474. *Poa glauca* Vahl – **Blásveifgras** – Mjög algengt um land allt.¹²¹
475. *Poa x jemtlandica* (Almq.) K.Richter – **Hjallasveifgras** – Sjaldgæft, en fundið á víð og dreif um landið norðan- og austanvert.¹³⁴
476. *Poa nemoralis* L. – **Kjarsveifgras** – Á víð og dreif um landið,¹²¹ ófundið á svæðinu frá Þistilfirði austur til Vopnafjarðar.
477. *Poa pratensis* L. – **Vallarsveifgras** – Algengt um land allt en afar breytilegt. Nokkrir stofnar hafa verið innfluttir til ræktunar, en aðrir eru innlendir. Skipting tegundarinnar í deilitegundir er mjög á reiki og rannsóknir skortir á íslenskum vallarsveifgrös. Skiptar skoðanir eru á því, hvaða deilitegundir vaxi hér, en einkum hafa þrjár verið taldar: subsp. **pratensis**, subsp. **subcaerulea** (Sm.) Hiitonen og subsp. **alpigena** (Fries ex Blitt) Hiitonen. Fleiri hafa verið nefndar en ekkert verður fullyrt um þær með vissu fyrir en meiri rannsóknir hafa farið fram.¹¹⁹
478. *Poa trivialis* L. – **Hásveifgras** – Allvíða um land nema ófundið á Norðausturlandi frá Melrakkasléttu austur í Vopnafjörð.
479. *Puccinellia capillaris* (Lilj.) Jansen – **Varpafitjungur** – Algengur með ströndum fram kringum landið, einkum í malar- og sandfjörum, einnig í klettum, sums staðar alllangt frá sjó.
480. *Puccinellia maritima* (Huds.) Parl. – **Sjávarfitjungur** – Allvíða við strendur landsins, vex einkum á sjávarfitjum innan um þéttan gróður.
481. *Phippsia algida* (Solander) R.Br. – **Snænarfagras** – Allvíða á Miðhálandinu og til fjalla á Norðurlandi og á Austfjörðum. Sjaldgæft annars staðar, ófundið á Suðvestur- og Suðurlandi.
482. *Festuca rubra* L. subsp. **richardsonii** (Hook.) Hultén – **Túnvingull** – Algengur um land allt. Auk subsp. **richardsonii**, sem líklega ætti fremur að teljast sjálfstæð tegund, vex hér einnig subsp. **rubra**, **rauðvingull**, sem er innfluttur til sáningar bæði í túnum, meðfram vegum og til landgræðslu. Mikill breytileiki er í íslenska túnvinglinum, og er honum stundum skipt niður í fleiri afbrigði.
483. *Festuca vivipara* (L.) Sm. – **Blávingull** – Algengur um land allt.
484. *Schedonorus pratensis* (Hudson) P. Beauv. – **Hávingull** – Sjaldgæfur, villtur aðeins í Pétursey í Mýrdal⁸² og líklega einnig á Sjóundaá á Rauðasandi.⁸¹ Finnst auk þess sem slæðingur allvíða um landið.
485. *Glyceria fluitans* (L.) R.Br. – **Flóðapuntur** – Algengur á nokkru svæði í Flóanum og þar fyrir austan.
486. *Nardus stricta* L. – **Finnungur** – Algengur í útsveitum nema á Suðurlandi. Þar ófundinn frá Ölfusá austur að Eyjafjöllum og einnig ófundinn á svæðinu frá Mýrdalssandi austur í Hornafjörð. Mj. sj. inn til landsins og á hálandinu.
487. *Bromopsis inermis* (Leysser) Holub – **Sandfax** – Fjölært gras, innflutt og fyrst notað í ræktunartilraunum upp úr aldamótum 1900, en barst síðar inn í landið með hernáminu 1940–1945 og til tilrauna í landgræðslu^{108, 111} og hefur síðan dreifst út smátt og smátt. Vex nú víða um land fyllilega ílent og myndar sums staðar þéttar breiður.

488. **Elymus alopec** B. Salomon – **Kjarrhveiti** – Allvíða í innsveitum frá Skagafirði austur að Mývatnsheiði, einnig fundið í innsveitum Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs. Annars staðar mjög sjaldgæft.
489. **Elymus kronokensis** (Kom.) Tzvelev subsp. **borealis** – **Bláhveiti** – Víða í innsveitum Austur-Húnavatnssýslu, Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Annars mjög sjaldgæft, ófundið á Vestur-, Suður- og Austurlandi.
490. **Elytrigia repens** (L.) Desv. ex Nevski – **Húsapuntur** – Algengur í byggð og við ströndina um land allt.
491. **Leymus arenarius** (L.) Hochst. – **Melgresi** – Algengt í sandi með ströndum landsins, og mikið einnig á móbergssvæðum hálendisins, einkum þar sem foksandur er.
- Digitaria ischaemum (Schreber ex Schweigger) Muhl. – **Fingurax** – Hefur verið skráð sem slæðingur í Hveragerði 1969, einkum í gróðurhúsum.^{112, 114}
- Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel – **Pakreyr** – Mj. sj., aðfluttur við flugvöllinn á Akureyri og skráður þar nokkuð út.
- Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – **Strandreyr** – Slæðingur á ýmsum stöðum, sums staðar farinn að ílendast.¹¹¹ Þarna er bæði um að ræða hvítröndótt afbrigði sem slæðist frá ræktun,^{96,147} en einnig venjulegan strandreyr.¹³⁴
- Phalaris canariensis L. – **Kanarigras** – Sj. slæðingur í Reykjavík, Húsavík og á Sauðárkróki 1893–1966.^{111, 134}
- Alopecurus myosuroides** Huds. – Sj. slæðingur á Eiðsgranda, Seltjarnarnesi 1972.
- Agrostis gigantea Roth – **Stórlíngresi** – Slæðingur sem óx á tveim stöðum á landinu 1930–1940,¹³⁴ ekki vitað hvort hann finnst nokkurs staðar í dag.
- Calamagrostis epigeios (L.) Roth – **Melahálmgresi** – Mjög sjaldgæfur slæðingur sem sést hefur á tveim stöðum í nágrenni höfuðborgarinnar.¹³⁴
- Calamagrostis phragmitoides Hartm. – **Purpurahálmgresi** – Fjölært gras sem fannst árið 2003 á einum stað á eyðibýli í nágrenni Hallormsstaðar.¹³⁴
- Apera spica-venti (L.) P. Beauv. – **Akurvindgresi** – Mjög sjaldgæfur slæðingur, skráður við Sundahöfn í Reykjavík 1976–1977.¹³⁴
- Avena fatua L. – **Flughafnar** – Aðeins skráðir einu sinni sem slæðingur í Reykjavík 1966.¹³⁴
- Avena sativa L. – **Hafnar** – Einært gras sem sífellt berst inn í landið vegna ræktunar og sem korn til fóðurs, en helst ekki við af sjálfsdáðum.
- Cynosurus cristatus L. – **Kambgras** – Slæðingur á Akureyri 1927.⁷⁴
- Poa palustris** L. – **Mýrasveifgras** – Slæðingur í Reykjavík, ótímasett úr safni Steindórs Steindórssonar, áður greint sem *Poa trivialis*.
- Festuca ovina L. – **Sauðvingull** – Hefur verið notaður í ræktunartilraunum allengi og hefur hugsanlega eitthvað slæðst þaðan, en upplýsingar um það skortir. Ekki er vitað til þess að sauðvingull vaxi villtur á Íslandi, en blávingull hefur stundum gengið undir þessu nafni.
- Schedonorus arundinaceus (Schreber) Dumort. – **Tágavingull** – Mj. sj. slæðingur, skráður í Reykjavík 1937.¹³⁴
- Lolium multiflorum Lam. – **Ítalskt rýgresi** – Einært sáðgresi sem berst víða um með sáningum, en helst ekki við til lengdar.¹³⁴
- Lolium perenne L. – **Vallarrýgresi** – Slæðingur frá sáðsléttum og vegaáningum sem helst að jafnaði ekki við nema skamma hríð.¹¹¹
- Lolium remotum Schrank – **Eiturrýgresi** – Mj. sj. slæðingur við Skóga undir Eyjafjöllum 1953.^{111, 149}
- Lolium temulentum L. – **Akurýgresi** – Slæðingur sem aðeins hefur fundist einu sinni, í Reykjavík 1966.¹³⁴
- Bromus arvensis L. – **Akurfax** – Einært, innflutt gras sem hefur lítið eitt verið ræktað í sáðsléttum, hefur fundist á örfáum stöðum sem slæðingur.^{74, 117} án þess að ílendast.
- Bromus hordeaceus L. – **Mjúkfax** – Einært gras sem hefur borist til landsins með grasfræi og kemur stundum fram í sáningum. Hverfur oftast fljótlega aftur og mun ekki hafa ílenst svo vitað sé.
- Bromus secalinus L. – **Rúgfax** – Einært gras sem fundist hefur sem slæðingur á örfáum stöðum.⁸⁰
- Anisantha tectorum L. – **Pakfax** – Óstöðugur slæðingur sem hefur sést á fáum stöðum á mismunandi tímum, en helst ekki við til lengdar.¹⁴⁷
- Secale cereale L. – **Rúgur** – Stakar plöntur finnast alltaf öðru hverju, sem vaxa upp af rúgkorni, en ílendast ekki til frambúðar.
- Triticum aestivum L. – **Hveiti** – Finnst öðru hverju í ýmsum landshlutum, dreifist með korni úr fóðurvörum sem spírar, en nemur ekki land.^{111, 112, 117}
- Elymus smithii (Rydb.) Gould – **Herpuntur** – Aðeins í Reykjavík, á háskólalóðinni, við flugvöllinn og við Elliðaárvog.¹⁰⁸ Barst til landsins með hernum á stríðsárunum, var á tímabili nokkuð útbreiddur og talinn vera að ílendast.^{76, 111} Hefur ekki sést á síðari árum þrátt fyrir leit og er nú talinn vera útdauður.
- Leymus mollis (Trin.) Hara – **Dúnmelur** – Sjaldgæfur. Innfluttur 1945 frá Alaska til landgræðslu.³² Skráður á nokkrum stöðum á Suðvestur- og Suðurlandi en óvíst þó um útbreiðslu.

Hordeum jubatum L. – *Silkibýgg* – Slæðingur sem fundist hefur á allmörgum stöðum við bæi og í sáðsléttum síðan um 1950.^{96, 111}

Hordeum marinum Hudson – *Mararbygg* – Mj. sj. slæðingur, aðeins fundinn í Hafnarfirði 1973.¹³⁴ Auk subsp. marinum hefur subsp. gussonianum sést við gróðrarstöðvar í Haukadal í Biskupstungum (1961) og Norðtungu í Borgarfirði (1984).¹³⁴

Hordeum vulgare L. – *Bygg* – Slæðingur sem sífellt berst að með korni, en nemur ekki land að neinu marki.